

國立臺南大學七股校區

鳥類圖鑑



國立臺南大學出版發行

序

七股的彩羽

本校七股校區位於臺南縣七股鄉曾文溪北岸，此區域自然生態豐富，包含七股潟湖、紅樹林、魚塢、沙洲等自然環境，在此難得的機緣下，增進師生認識七股濱海濕地多樣性的生物，並利用七股校區週邊豐富的自然與人文環境，建構完整的本土環境教育體系，期能提昇師生的自然與人文關懷，為自然生態與環境之永續經營貢獻一份心力。

生物資源的調查為基礎性工作，今年（2009）在教育部經費補助下，本校生物科技系根據採集和調查的成果，已出版《臺南大學七股校區植物圖鑑》，獲得各界的肯定。現今環境與生態學院更持續完成《臺南大學七股校區鳥類圖鑑》，共介紹七股地區鳥類96種，提供師生及各界人士參考使用，深具意義。

本圖鑑能順利印行要歸功於許多人的付出和努力：本校生物科技系退休教師黃民雄老師、教育系唐清良老師、生物科技系謝宗欣老師、材料系研究生黃嘉隆先生，以及鳥類攝影家劉嘉斌先生（文武）、洪董先生、簡廷謀先生（竹間小六）等人，同意無償提供他們的攝影作品供本書使用；此外，本校生態科學與技術系許皓捷老師協助鑑定與審定全書、校友吳虹毅小姐撰寫文稿、選定圖片、版面編排等，使內容更臻完善，他們不計辛勞的奉獻，讓我們得以一窺七股鳥類世界之奧妙，謹此致上誠摯的敬意與謝意，深信本書定能獲得大家的迴響。

國立臺南大學 校長

黃序霜

謹識

2009年8月

誌謝

認識生物的名字及特性，為生物研究中最基礎之工作。在教育部經費補助下，生物科技系在4月份出版七股校區植物圖鑑，現在9月候鳥季時，再出版七股校區鳥類圖鑑，希望七股校區豐富的自然生態能受到了解，並廣為流傳。

本手冊能得以完成，完全要歸功於許多人士的付出和努力；首先是本系退休教師黃民雄老師，黃老師在任教期間對於鳥類頗有涉獵，退休後更開始一頭栽進賞鳥與拍鳥的世界，我想要編輯本書時求助於老師，黃老師立即答應並前後20餘次找出他多年來的攝影作品，這些精美的圖片是本書最堅實的基礎，身為學生的我對老師真是充滿了敬意與感謝；感恩黃老師才有這本書的問世，也恭喜老師自由遨遊於野鳥天地，體驗生命之美。

感恩本校教育系唐清良老師，唐老師曾擔任本校視聽教育中心主任多年，攝影的功力早已受到大眾肯定，更可貴的是唐老師認識更多的鳥類攝影同好，在他的介紹下，劉嘉斌先生（文武）、洪董先生、簡廷謀先生（竹間小六）同意提供他們的作品。唐老師與三位攝影名家精美的作品，使本書更形出色，更可貴的是本書所有的作者都無償提供作品，我們並沒有能力提供任何經費給他們。拍攝鳥類是一種需要設備、技術和耐心的工作，因而每一幅照片都極為珍貴，我們常可聽聞因不慎使用他人鳥類圖片而產生的智慧財產權官司，相形之下所有作者慷慨提供照片供本書使用的善舉更令人感動，因此我們在每張照片的下面標示攝影者的大名，以茲感謝，並希望這些鳥類透過他們的攝影而廣為流傳。

感恩本校生態科學與技術系許皓捷老師，許老師是鳥類分類與生態的專家，他幫忙鑑定圖片中的鳥種，更在文稿完成後幫忙審定，使本書更形完善。感恩實驗室吳虹毅小姐，吳小姐就讀本校社教系期間，就參加生態保育社，對鳥類頗有涉獵，她從撰寫文稿、選定圖片到版面編排一肩扛起，使本書能從構想到具體實現，透過她的細心和巧手，讓我們看見美麗的野鳥世界。還要感謝實驗室研究生黃嘉隆先生提供小雨燕的照片，感恩大家一起成就這一樁美事。

敬邀您一起進入七股的鳥類世界。

策劃：謝宗欣 謹誌



目錄

2

校長序

3

誌謝

6

如何使用本書

7

七股校區位置圖

8

賞鳥指南

10

鳥類介紹

11

鷺鶯目

鷺鶯科/11

小鷺鶯/12

16

鵝形目

鸕鶿科/16

鸕鶿/17

18

鵞形目

鵞科/18

蒼鵞/19

大白鵞/21

中白鵞/23

小白鵞/25

黃頭鵞/27

夜鵞/30

黃小鷺/33

栗小鷺/36

鸚科/34

黑面琵鷺/39

白琵鷺/42

埃及聖鸚/43

44

雁形目

雁鴨科/44

尖尾鴨/45

小水鴨/47

綠頭鴨/48

琵嘴鴨/50

白眉鴨/52

赤頸鴨/53

55

隼形目

隼科/55

紅隼/56

鵟科/58

魚鷹/59

61

鶴形目

三趾鶉科/61

棕三趾鶉/62

秧雞科/64

紅冠水雞/65

白冠雞/67

白腹秧雞/68

緋秧雞/70

72

鴿形目

彩鴿科/72

彩鴿/73

反嘴鴿科/76

高蹠鴿/77

反嘴鴿/81

燕鴿科/83

燕鴿/84

鴿科/86

小環頸鴿/87

東方環頸鴿/89

灰斑鴿/92

金斑鴿/93

鐵嘴鴿/95

蒙古鴿/96

鴿科/97

磯鴿/98

黑腹濱鴿(濱鴿)/100

長趾濱鴿(雲雀鴿)/101

彎嘴濱鴿(游鴿)/102

紅胸濱鴿(禱鴿)/104

尖尾濱鴿/106

寬嘴鴿/107

青足鴿/109

小青足鴿/114

黃足鴿/116

赤足鴿/117

鷓鴣/119
田鴿/122
鷹斑鴿/124
中杓鴿/126
黑尾鴿/127
翻石鴿/128
紅領瓣足鴿/129

鷗科/130

小燕鷗/131
黑腹燕鷗/133
白翅黑燕鷗/135
裏海燕鷗/138
鳳頭燕鷗/140
紅嘴鷗/142

144

鴿形目

鳩鴿科/144

紅鳩/145
斑頸鳩/146
鴿子/147

148

鴿形目

杜鵑科/148

番鴿/149

151

雨燕目

雨燕科/151

小雨燕/152

153

佛法僧目

翠鳥科/153

翠鳥/154

160

雀形目

雲雀科/160

小雲雀/161

燕科/163

洋燕/164
家燕/166
赤腰燕/168
棕沙燕/170

鵲鴿科/171

黃鵲鴿/172
白面白鵲鴿/176
灰鵲鴿/178

鶇科/180

白頭翁/181

伯勞科/184

紅尾伯勞/185
棕背伯勞/186

卷尾科/188

大卷尾/189

八哥科/191

八哥/192
家八哥/193
白尾八哥/195

鶇科/197

赤腹鶇/198

鷓鴣科/199

藍磯鷓/200
野鴿/202
黃尾鴿/204

繡眼科/206

綠繡眼/207

麻雀科/210

麻雀/211

梅花雀科/212

斑文鳥/213
白腰文鳥/215
黑頭文鳥/216

扇尾鶯科/217

褐頭鷓鶯/218
灰頭鷓鶯/219
棕扇尾鶯/221

鶯科/222

極北柳鶯/223

鴉科/224

喜鵲/225

鴉科/227

黑臉鴉/228

229

中名索引





如何使用本書

中名 尖尾鴨

學名 學名：*Anas acuta*
英名：Northern Pintail

體長 ♂ 75cm
♀ 53cm

種類分 普通 不普 兩普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 陸化

佈狀況、居留習性 尖尾鴨是雁鴨科鳥類中的高個子，在台灣의 度冬族群龐大，常成群棲息在河口、沼澤、湖泊、潮間帶等大型水域，以水草及水生昆蟲為主食。覓食時常將上半身垂直沒入水中，只留尾部翹在水面上。

習性：描述鳥類的棲息環境、生態習性、覓食、繁殖行為或其他特殊行為等。

辨識特徵：描述本種鳥類嘴形、腳、繁殖羽、非繁殖羽羽色變化、明顯特徵、鳴聲等，以作為野外辨識鳥類輔助。

檢索書眉：上段色塊是目名，下段色塊是科名。

主要棲息活動環境(以藍色色塊標示)

雁形目

雁鴨科

圖片

攝影者 文武攝

圖說

▲ 雄鳥有著又尖又長的尾羽，頭後側有顯眼的白線

沼澤、湖泊、水塘
河口、灘間帶、沙洲
漁塘
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

39



七股校區位置圖




台南大學七股校區位於台南縣七股鄉曾文溪北岸，由台南縣政府無償捐贈本校作為設校用地，面積120公頃，此區域自然生態頗為豐富，包含七股潟湖、紅樹林、魚塭、沙洲等自然環境，世界瀕危鳥種黑面琵鷺集中於曾文溪口北岸之300公頃浮覆地度冬，此保護區恰好位於本校七股校區之旁邊，根據近年之調查其數量有逐年增加之趨勢，已成為全球數量最多之度冬棲習地，每年平均吸引前往觀賞的遊客有20萬人以上，因此認識七股濱海濕地生物多樣性及推廣黑面琵鷺生態保育觀念，並利用七股校區週邊豐富的自然與人文環境，建構完整的本土環境教育體系，希望能提昇師生的自然與人文關懷。



賞鳥指南

鳥

類的各部名稱



野

鳥分類小常識

留鳥：終年以台灣為棲息地、繁殖地。

夏候鳥：春季由溫暖的南洋遷移而來，春夏季在台灣有繁殖行為，秋季到時飛回南方渡冬。

冬候鳥：秋冬季由漸漸寒冷的北方遷移來溫暖的台灣渡冬，春季再飛回北方繁殖的鳥類。

過境鳥：春秋季遷移途中，短暫停留台灣作為休息驛站，當體力恢復或氣候好轉後，再繼續南遷或北返。

普遍：在野外普遍可見。

局普：在台灣局部地區普遍可以看到。

不普：在台灣不是普遍可以看見。

稀有：數量稀少，在野地不容易見到。

歸化：外來種被人類引入台灣後野放或逃出野外，久而久之在台灣繁殖，形成歸化種。

賞鳥裝備不可少

1 望遠鏡



---望遠鏡是賞鳥的必備工具，通常可分為單筒望遠鏡和雙筒望遠鏡，賞鳥時通常必備一付雙筒望遠鏡，適合用來觀賞活潑愛跳動的山鳥、陸鳥。

---挑選雙筒望遠鏡時需注意它的「倍數」及「物鏡直徑」，望遠鏡身上會標示著「7X25」、「8X32」等等的數字，以「7X25」來說，7是望遠鏡的倍數，會影響放大的倍率；25是物鏡的直徑，會影響亮度及望遠鏡的大小；我們通常選用7~10倍的雙筒望遠鏡。

---單筒望遠鏡的倍數通常在20~40倍，適合用來觀察遠距離的水鳥。單筒望遠鏡的體積大、重量重，因此需搭配穩定的腳架。

2 圖鑑

筆記本



---除了望遠鏡，圖鑑也是賞鳥不可或缺的工具書，一般市面上的圖鑑有手繪式的，如亞舍圖書有限公司發行的「台灣野鳥圖鑑」，手繪圖能明確顯示鳥類的各種特徵；另外還有照片式的如本書或「台灣鳥類圖誌」、「台灣溼地鳥的辨識」，照片式的圖鑑較為生動自然富變化，也較能從照片中觀察各種鳥類棲息的環境。另外，如能準備筆記本隨時紀錄或畫下所觀察的狀態及心得，辨識鳥的功力一定會大幅躍增。

3 衣著



---應穿著輕便舒適的大地色系或綠色等接近自然環境的服裝，不宜過於豔麗，以避免嚇到鳥類。另外可再準備一頂深色帽子，便於遮陽及偽裝。

- ✓ 請穿著與環境顏色接近的服裝
- ✓ 一頂深色圓帽可遮陽、偽裝
- ✓ 自備水、乾糧及簡易藥品
- ✓ 在野外隨時注意自身安全



鳥

類

介

紹





小鸕鶿成鳥繁殖羽 / 黃民雄 攝

鸕鶿科

- 鸕鶿科鳥類是善於游泳與潛水的高手，趾間有瓣蹼，可張開助於潛泳。
- 嘴尖，尾羽甚短；腳位於腹部較後端，因此不善行走。飛行前，需要在水面助跑才能起飛。
- 主要棲息於池塘、沼澤與湖泊；以魚類、水生昆蟲為主食。



小鸞鵝

學名：*Tachybaptus ruficollis*

英名：Little Grebe

26cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

小鸞鵝是潛水高手，以小魚小蝦、水生昆蟲為主食。常會成小群出現於沼澤、湖泊、或水塘地帶，大多在深水區域活動。以水為家，很少上岸，連築巢也是以蘆葦、水草等築於水面。

繁殖育幼期，雛鳥常乘坐於親鳥背上一起出遊，畫面相當有趣。台語俗稱「水避仔」。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴尖，尾羽甚短，外型似沒有尾巴的水鴨。
- 2、嘴基部內側有乳黃色斑，眼黃色，頰、頸側、前頸紅褐色。
- 3、足部生長偏向身體後方，游泳時，腳像螺旋槳一樣有推進的作用，且趾間有瓣蹼，是潛水高手。
- 4、叫聲：匹匹匹或ㄎ一哩哩哩。



黃民雄 攝

▲ 小鸞鵝幼鳥



▲ 小鸕鷀成鳥

黃民雄 攝



▲ 小鸕鷀親鳥載著幼雛

洪董 攝





鸕鷀科

- 鸕鷀科鳥類嘴尖狹長且前端下鉤，腳短，趾間有蹼，擅長潛水及游泳，是捕魚高手。
- 常棲息在沿海附近、潟湖、沼澤、湖泊等區域，群居性，夜晚會於樹上休息。
- 起飛時需於水面助跑，飛行時常排列成隊。



鸕鶿

學名：*Phalacrocorax carbo*

英名：Great Cormorant

82cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

鸕鶿為大型水鳥，常出現在瀉湖、海灣、湖泊、河口等地區，趾間有蹼，擅長潛水捕魚，潛水時還可同時划動雙腳及雙翅加速。潛水後常站立在樹枝、蚵架、礁岩上，張開雙翅來晾曬。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鵜形目

鸕鶿科



▲ 鸕鶿擅長潛水捕魚

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身以黑色為主，背羽為銅褐色，臉部裸露皮膚呈白色，嘴狹尖前端下鉤，嘴基部內側黃色。
- 2、繁殖羽時頭頸部會出現白色絲狀的羽毛，下脅部有白斑。



黃民雄 攝



鷺科

- 鷺科鳥類多數善涉水，常駐立於水中、稻田或水邊捕食，為中至大型水鳥。多數有長腳、長頸和長而尖的嘴。
- 有些種類於繁殖期間，頭、胸部和腰上會長出纖細的飾羽。叫聲單調少變化，以魚蝦、蛙類、昆蟲為主食。
- 部份種類如小白鷺、夜鷺，有集體築巢或聚集的現象，形成鷺鷥林；有些種類則生性隱密，單獨活動，如栗小鷺、黃小鷺等。

蒼鷺

學名：*Ardea cinerea*

英名：Grey Heron

93cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

蒼鷺為臺灣可見鷺科中體型最大者。飛行時會縮起長頸且振翅緩慢優雅，展翅可達160cm。通常成群棲息於河口溼地、沼澤、鹽灘地、乾涸魚塭、潮間帶等地區，常於淺水處覓食，有時會長時間埋伏佇立於水邊不動來等待魚類。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷺形目

鷺科



▲ 蒼鷺全身以灰色為主，頭頂有黑色飾羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、身體灰色，嘴腳皆為黃褐色。
- 2、頭灰白色，兩側有黑色飾羽。頸甚長，灰白色，前頸兩側有數排黑色縱紋。



▲ 蒼鷺常佇立水邊許久等待獵物上門

黃民雄 攝



▲ 蒼鷺以魚類、青蛙、蝦蟹為主食

黃民雄 攝

大白鷺

學名：*Egretta alba*

英名：Great Egret

90cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

大白鷺通常出現在河口沼澤、海邊泥灘地、沙洲、湖泊等區域，常混群於其他鷺科鳥類中。喜歡伸長脖子漫步於水中，覓食時常會用腳擾動水，以捕食受驚嚇四竄的魚。飛行姿態優雅，振翅緩慢，降落時會快速滑翔而下。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鵞形目

鷺科




▲ 大白鷺頸部特長，可呈大幅度的S形

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、體型高大，身體雪白，頸甚長，可呈大幅度S形，有一接近90度的轉折處。
- 2、在春夏時節北返前這段時間，頸部和背部會長出簞狀飾羽，嘴喙則由黃轉成黑色。
- 3、嘴裂深，超過眼後較多。



黃民雄 攝

嘴裂深至眼後



▲ 大白鷺與黑面琵鷺(中)，大白鷺背部可見漂亮的飾羽

黃民雄 攝



▲ 大白鷺(右)與中白鷺(左)

黃民雄 攝

中白鷺

學名：*Egretta intermedia*

英名：Intermediate Egret

69cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

中白鷺體型介於大、小白鷺間，生性機警，不易靠近，多出現在沼澤、河口溼地、魚塭、湖泊、內陸的農耕地、水田與埤塘等區域，於內陸時大多單獨出現，偶爾與黃頭鷺混群。中白鷺覓食時常安靜地站在水澤中等候獵物上門，除了魚類，也喜歡啄食地上的昆蟲和青蛙。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 中白鷺成鳥非繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身白色，腳及腳趾黑色，嘴裂較淺，約裂到眼下。
- 2、非繁殖期嘴黃色，先端黑色。繁殖期嘴黑色，前頸下、背部有飾羽。
- 3、外型似大白鷺，不過脖子彎曲弧度較小，脖子也較粗圓。



▲ 中白鷺嘴裂淺，約裂至眼下

黃民雄 攝



▲ 中白鷺大部分為冬候鳥，少部份會留下成為留鳥

黃民雄 攝

小白鷺

學名：*Egretta garzetta*

英名：Little Egret

61cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

小白鷺是相當常見的鷺科鳥類，海拔分佈亦較同科鳥類廣，從河口沼澤、溼地、魚塢、平原、水田、農耕地到中海拔溪流等各區域均可見到蹤跡。常以腳探入水中抖動驚擾魚蝦後捕食。繁殖期有與夜鷺、黃頭鷺集體築巢於木麻黃林、紅樹林上的現象。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塢
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷺形目

鷺科



▲ 小白鷺成鳥

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身白色，嘴、腳均為黑色，腳趾為黃綠色，像穿了雙黃色雨鞋一樣。
- 2、繁殖期頭後會長出兩根飾羽，前頸下、背部會有簞狀飾羽。



唐清良 攝

▲ 小白鷺成鳥繁殖羽

小白鷺的覓食行爲

鵜形目

鷺科



小白鷺以腳擾動水中魚蝦



黃民雄 攝

黃頭鷺

學名：*Bubulcus ibis*

英名：Cattle Egret

50cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

黃頭鷺因常停棲在牛背上，又稱為「牛背鷺」。以昆蟲為主食，偶爾也吃青蛙、魚類等，多出現在稻田、農耕地、草原、牧場、沼澤或低海拔山區等較乾旱的地區，常成群活動。於鄉下田野間春耕時節，常見黃頭鷺跟隨於耕耘機或牛隻後面，捕食被驚擾而飛起的昆蟲。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鵞形目

鷺科



▲ 黃頭鷺成鳥繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、非繁殖羽時，全身雪白，嘴黃色，腳黑色。
- 2、繁殖羽時，頭頸部會長出橘黃色漂亮的飾羽。



▲ 黃頭鷺成鳥非繁殖羽(左)、繁殖羽(右)

黃民雄 攝



▲ 黃頭鷺常成群於農耕地中捕食昆蟲

黃民雄 攝



▲ 黃頭鷺為較偏陸地型的鷺科鳥類

謝宗欣 攝



▲ 展翅飛翔

黃民雄 攝

夜鷺

學名：*Nycticorax nycticorax*

英名：Black-crowned Night Heron 58cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

台語俗稱的「暗光鳥」，常於晨昏及夜晚時間活動，以魚蝦、昆蟲、蛙類為主食，通常棲息在平地的溼地、沼澤、魚塢、河流到低海拔山區的水域地帶。停棲時，常蹲縮著身體，單腳站立。繁殖期時常與小白鷺、黃頭鷺集體營巢。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塢
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 夜鷺成鳥

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、腳黃色，全身灰褐色調，頭及背部呈有光澤的藍黑色，頭後有2~3根白色長飾羽，繁殖期時腳部會偏紅色。
- 2、亞成鳥全身黃褐色調，腹面顏色較淡有褐色縱斑，背面顏色較深有淺色三角形小斑點。



▲ 夜鷺飛翔

謝宗欣 攝



▲ 夜鷺亞成鳥

謝宗欣 攝

► 夜鷺成鳥，繁殖期時腳部因充血而偏紅色。



黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、身體以黃棕色為主，雄鳥頭上有鉛黑色頭冠，雌鳥頭上栗褐色。
- 2、飛羽及尾羽黑色，頸至胸有褐色縱斑。

雄鳥有黑色頭冠



黃小鷺

學名：*Ixobrychus sinensis*

英名：Chinese Little Bittern 36cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

黃小鷺為小型鷺科鳥類，生性隱密，多單獨出現在平地沼澤、稻田、池塘、潮溝的草叢地帶，以魚類、兩棲類、昆蟲等為主食。警覺性高，受干擾時，會有伸長頭頸不動、擬態的警戒行爲；飛行高度低，幾乎是貼著草澤上緣飛行，飛行時可見翅膀邊緣顯眼的黑色。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

黃民雄 攝

▲ 黃小鷺雄鳥 / 黃民雄攝



▲ 黃小鷺雄鳥

黃民雄 攝



▲ 黃小鷺雌鳥

黃民雄 攝



▲ 黃小鷺雄鳥

唐清良 攝



▲ 黃小鷺擬態行爲

黃民雄 攝

栗小鷺

學名：*Ixobrychus cinnamomeus*

英名：Cinnamon Bittern

40cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

栗小鷺全身以栗紅色為主，習性似黃小鷺，大多單獨出現於平地至低海拔農耕地、池塘、潮溝、沼澤、廢棄鹽田等草叢地帶。生性隱密，不易被發現，有伸長脖子佇立於草叢中的擬態行爲。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 栗小鷺雄鳥

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、雄鳥全身以栗紅色為主，喉至胸部有栗褐色縱線。
- 2、雌鳥背部紅褐色，有白色斑點，頸至胸有數條黑褐色縱斑。



栗小鷺雌鳥 / 黃民雄 攝



黃民雄 攝



鸛科

- 鸛科鳥類通常嘴長但外觀不一，有向下彎曲者及筆直但末端呈現匙狀者。
- 頸長，飛行時頸部呈直線；尾羽短，前趾基部有蹼。
- 主要棲息於海邊、沼澤、河口溼地、魚塭等地帶，為中至大型水鳥。

黑面琵鷺

學名：*Platalea minor*

英名：Black-faced Spoonbill

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

74cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

黑面琵鷺為全球性瀕臨絕種鳥類，目前全世界數量約兩千餘隻，每年有三分之二以上的族群會到台灣度冬，而又以七股為最主要度冬地。度冬時多以大群的方式棲息在近海開闊的水域，覓食方式特殊，會邊行走邊以飯匙狀的嘴在水中來回掃動捕食魚蝦。



▲ 黑面琵鷺金黃色的繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身羽色以白色為主，臉及腳黑色；嘴肉色至黑色，因年紀不同而有顏色深淺之別。
- 2、嘴長，前端呈扁平的飯匙狀。
- 3、繁殖期時，成鳥在頭冠部及頸胸部會出現黃色的飾羽。



飯匙或琵琶狀的嘴



▲ 黑面琵鷺以嘴喙整理羽毛

黃民雄 攝



▲ 黑面琵鷺以飯匙狀的嘴在水中來回掃動覓食

黃民雄 攝



▲ 黑面琵鷺飛行時頸部伸直

黃民雄 攝



▲ 岸邊休息理羽

黃民雄 攝

白琵鷺

學名：*Platalea leucorodia*

英名：Eurasian Spoonbill

86cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

白琵鷺外型類似黑面琵鷺，但白琵鷺體型稍大於黑面琵鷺，且黑面琵鷺嘴喙黑色部份延伸至眼周圍，白琵鷺則無，此為兩者判別的重點。白琵鷺於全世界數量多於黑面琵鷺，但白琵鷺來台度冬的數量稀少，常單獨與其他鷺科鳥類、黑面琵鷺混群。



▲ 白琵鷺(前)與小白鷺(後)

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身羽色大致為白色，臉白色；嘴肉色至黑色，因年紀不同而有顏色深淺之別；腳為黑色。
- 2、嘴長，前端呈扁平的飯匙狀，因狀似琵琶，故稱琵琶。
- 3、繁殖期時，成鳥在頭冠部及頸胸部會出現黃色的飾羽。

埃及聖鸛

學名：*Threskiornis aethiopicus*
英名：Sacred Ibis

76cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

埃及聖鸛為外來種鳥類，原分布於非洲，多年前由國內動物園引進，部份逃離後，逐漸適應臺灣環境，進而繁衍成群。常成小群出現在沼澤、泥灘地、濕地、水田，以蝦蟹、蛙類、昆蟲等小型動物為食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鸛形目

鸛科



▲ 埃及聖鸛有鐮刀般的黑色彎嘴

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身羽色大致為白色，外觀十分類似黑頭白鸛，差別在於埃及聖鸛飛羽外緣黑色，停棲時翅膀收縮，尾部呈黑色。
- 2、嘴黑色，長而下彎，頭至頸部裸露黑色皮膚，腳亦為黑色。



謝宗欣 攝



雁鴨科

- 雁鴨科鳥類在台灣多數為冬候鳥，每年秋天一到，湖泊、海邊、河口等地區總熱鬧非凡，聚集許多度冬的雁鴨群。
- 此科鳥類大多嘴形扁平，頸長，腳短有蹼，善於游泳，以各類水生動植物為主食。
- 飛行時，頸、腳伸直；當集體飛行時，會排列成整齊的隊伍。



尖尾鴨

學名：*Anas acuta*

英名：Northern Pintail

♂ 75cm

♀ 53cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

尖尾鴨是雁鴨科鳥類中的高個子，在台灣의 度冬族群龐大，常成群棲息在河口、沼澤、湖泊、潮間帶等大型水域，以水草及水生昆蟲爲主食。覓食時常將上半身垂直沒入水中，只留尾部翹在水面上。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雁形目

雁鴨科



▲ 雄鳥有著又尖又長的尾羽，頭後側有顯眼的白線

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、體態修長，頸較一般雁鴨長、臉頰扁。
- 2、雄鳥嘴鉛色，繁殖羽時尾下覆羽黑色，前端乳黃色；尾羽黑色，尾部中央會長出兩根纖細上翹、約12公分長的尾羽，爲其名稱由來；頭後側有一白線延伸至頸側，非常醒目。非繁殖羽時，體色類似雌鳥，且尾羽短。
- 3、雌鳥全身棕褐色，尾羽短，嘴黑褐色。
- 4、公母鳥體長差異大。



▲ 尖尾鴨雄鳥

黃民雄 攝



▲ 尖尾鴨雌鳥(左)、雄鳥(右)

黃民雄 攝

小水鴨

學名：*Anas crecca*

英名：Green-winged Teal

38cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

小水鴨是台灣度冬族群的雁鴨中體型最小但數量最多的一種，棲息在湖泊、沼澤、河口、沙洲或溪流地帶，常數隻至數百隻群聚生活。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雁形目


雁鴨科



黃民雄 攝

◀ 雄鳥臉戴著墨綠色彎月形眼罩

▼ 雌鳥全身羽色樸素



黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、雄鳥繁殖羽羽色豔麗，頭頸紅褐色，胸至體側有細波形紋路，體側及體背有一白色線斑；臉部圖案特殊，眼後有彎月形鑲黃邊的墨綠色眼罩；尾側有乳黃色三角形斑塊。
- 2、雌鳥全身暗褐色，具鱗狀斑紋。



綠頭鴨

學名：*Anas platyrhynchos*

英名：Mallard

59cm


普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

綠頭鴨通常出現在河口沙洲、沼澤、湖泊等淺水域，常與其他鴨種一起活動，以水生動植物為食，飛行速度相當快。近年來因人工繁殖，數量越來越多，也常可發現被飼養在公園水池中。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雁形目

雁鴨科




▲ 綠頭鴨雄鳥繁殖羽尾上羽毛捲起

黃民雄 攝


● 辨識特徵：

- 1、雄鳥繁殖羽，嘴呈黃綠色，頭至上頸部暗綠色有光澤，頸部有白色頸環，前頸至上胸為紫褐色，尾上覆羽黑色、向上捲起。
- 2、雌鳥全身褐色，嘴黃褐色有黑色雜斑。
- 3、公母鳥共同的特徵為藍色的翼鏡，但於飛行時才較容易見到。



▲ 綠頭鴨雄鳥非繁殖羽(左)、雌鳥(右)

黃民雄 攝



▲ 綠頭鴨雌鳥嘴黃褐色雜有黑色斑

謝宗欣 攝

琵琶鴨

學名：*Anas clypeata*

英名：Northern Shoveller

50cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

琵琶鴨因有湯匙、琵琶狀的嘴而得名，多在淺水處活動，會以匙嘴篩食水草、浮游生物或泥中小生物。通常數隻或成群棲息在河口、沼澤、沙洲、湖泊、潮間帶等廣闊水域，也常混群在其他鴨種中。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雁形目

雁鴨科




▲ 琵琶鴨雄鳥繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴大而扁平，呈湯匙狀。
- 2、腳橙紅色，雄鳥繁殖羽頭、頸皆為有光澤的墨綠色，嘴黑色，眼黃色，胸部白色，背部黑色，腹部栗紅色。
- 3、雌鳥全身呈現暗褐色調，眼黑、有過眼線，嘴黃褐色。



▲ 琵嘴鴨有著湯匙狀的大嘴

唐清良 攝



▲ 琵嘴鴨雌鳥

謝宗欣 攝

白眉鴨

學名：*Anas querquedula*

英名：Garganey

38cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

白眉鴨為春秋候鳥過境的先鋒部隊，因有粗長、顯著的白眉而得名，喜歡棲息在廣闊的淡水水域。在台灣多數為秋季南飛、次年春季（4月）北返的過境鳥族群，少數會停留下來成為冬候鳥。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雁形目

雁鴨科



▲ 白眉鴨雄鳥白色眉斑相當醒目

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、雄鳥繁殖羽頭、頸、胸紅褐色，體側以白灰色為底、有鱗紋，尾部灰褐色，白色眉斑長而粗，延伸至頸後甚為醒目。
- 2、雌鳥全身以黃褐色調、暗褐色斑點為主，過眼線下有一白斑，眉斑較短且不明顯。

赤頸鴨

學名：*Anas penelope*

英名：European Wigeon

50cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

赤頸鴨喜歡群聚生活於鹹水湖泊、魚塭、潮間帶等鹹水地區，淡水水域並不常見。通常以植物為主食，尤其喜歡藻類。會發出像口哨般響亮的叫聲，起飛時幾乎可從水面垂直飛起，乳黃色的額頭為最顯著的特徵。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雁形目

雁鴨科



▲ 赤頸鴨雄鳥額頭為乳黃色

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴鉛灰色，先端黑色。
- 2、雄鳥繁殖羽頭頸呈紅褐色，前額突出，額到頭頂為乳黃色。胸褐色，背至腹側為灰白色有暗色波浪狀橫紋，體側的翼上有一白斑，尾黑色。



黃民雄 攝



▲ 赤頸鴨雄鳥(左)、雌鳥(右)

謝宗欣 攝



▲ 赤頸鴨雌鳥

謝宗欣 攝



隼科

- 隼科鳥類具有修長的雙翅，爪子銳利，能於空中高速迫擊飛行中的鳥類或從空中垂直俯衝捕捉地面小動物，是飛行速度迅捷及勇猛的掠奪性鳥類。
- 主要棲息於空曠平原或海岸懸崖地帶。有些種類可在半空中定點振翅，向下俯視尋找獵物。



紅隼

學名：*Falco tinnunculus*

英名：Common Kestrel

♂ 33cm

♀ 39cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

紅隼主要生活在防風林、溼地、河口、草原、田野空曠地區，喜歡停棲在獨立的電線桿、枝頭。通常單獨行動，於清晨開始覓食至黃昏。常於空中定點飛行搜索獵物，發現獵物後急速俯衝攻擊，以鼠類、大型昆蟲或小型鳥類為主食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 紅隼雄鳥頭部鼠灰色

洪董 攝

● 辨識特徵：

- 1、雄鳥頭上至後頸鼠灰色，背紅褐色雜有黑褐色斑點，胸腹黃褐色有縱向斑。
- 2、雌鳥頭部淺褐色有縱紋，背部栗褐色有橫狀斑點。



紅隼公

▲ 紅隼喜歡停棲在獨立的枝頭上

洪董 攝



▲ 隼科鳥類以飛行速度快著稱

洪董 攝



黃民雄 攝

鵟 科



- 大型猛禽，魚鷹為鵟科唯一的一種鳥類。
- 嘴短向下呈鉤狀，有銳利強壯的趾爪。
- 生活於港灣、海岸、大型湖泊與池塘，以魚類為主食。

魚鷹

學名：*Pandion haliaetus*

英名：Osprey

♂ 54cm

♀ 62cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

魚鷹是獵魚高手，獵食時會在水面上空不斷盤旋或站立於水面附近突出物上搜索，鎖定目標後會定點鼓翅向下俯衝，用強壯銳利的趾爪捉魚，再帶至樹枝上進食。棲息於海岸、河口、大型湖泊、河川、水庫等寬闊水域地區，多半一隻或兩隻行動，適應力強，分佈於世界各地。

隼形目

鴉

科



▲ 飛行時可見腹部及翼下覆羽大致為白色

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴呈鉤狀，頭頸白色且有明顯黑褐色過眼線，具頭冠，上胸有黑褐色橫帶，翼下及腹面白色。
- 2、雙翼甚長，展開可達150cm~170cm。



▲ 魚鷹腳趾有特化的角質突起物及可反轉的外趾來幫助魚鷹抓緊獵物

文武 攝



▲ 抓住獵物後，會將獵物帶至附近的枯木或樹上慢慢享用

黃民雄 攝

三趾鶉科

- 三趾鶉科的鳥類通常身體圓胖，嘴短兩側扁平，前端略彎，腳僅三趾。
- 性好隱密，通常於地面活動，較少飛行。主要棲息於濃密草叢及樹林底層，以昆蟲、種子為主食。



棕三趾鶉 / 洪董 攝



棕三趾鶉

學名：*Turnix suscitator*

英名：Bustard Quail

14cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

棕三趾鶉個性機靈，通常單獨或成對出現在草叢邊或林下，也常沿著鄉間小徑覓食。主要棲息在平地草叢、曠野、旱田等地面，築巢也選擇在地面的凹處。孵蛋、育雛的工作皆由雄鳥負責。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近



▲ 棕三趾鶉雄鳥

洪董 攝


● 辨識特徵：

- 1、尾巴很短，身體圓胖，腳趾只有三趾。
- 2、身體以褐色為主，雜有白色或黑褐色斑點，胸腹部為淡黃褐色。
- 3、雌鳥喉部至前頸黑色，雄鳥喉部乳白色有細斑。



▲ 棕三趾鶉雄鳥負責孵蛋、育雛

洪董 攝



▲ 棕三趾鶉雌鳥喉部至前頸為黑色

洪董 攝



秧雞科

- 秧雞科鳥類體型短小圓胖，腳趾長，尾短，頭小，不善於飛行。
- 個性羞怯隱密，常單獨或三兩隻行動。喜歡隱藏在草叢中漫步覓食，主要棲息在沼澤溼地、水田、湖泊、溪畔的草叢地帶。



紅冠水雞

學名：*Gallinula chloropus*

英名：Moorhen

33cm


普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

紅冠水雞通常小群出現在溼地、水田、紅樹林或沼澤、湖泊、溪畔的草叢地帶，以植物種子、嫩芽及昆蟲為主食。生性機警，會在感覺到干擾時迅速躲入草叢中。腳趾細長，善於行走於水邊及水生植物上；紅冠水雞也擅長游泳，游泳時白色的尾部會上下擺動；較少飛行，當要飛離水面時，需要先助跑一段距離才能起飛，且只能短距離低空飛行。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鶴形目

秧雞科



▲ 紅冠水雞成鳥

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、身體黑褐色，體側有白斑，尾羽下兩側有橢圓形白斑。
- 2、嘴、額板紅色，嘴先端呈黃色。腳黃綠色，趾爪細長。
- 3、叫聲咕嚕咕嚕。



▲ 紅冠水雞親鳥餵食幼鳥

黃民雄 攝



▲ 紅冠水雞亞成鳥會幫忙父母親照顧較小的雛鳥

黃民雄 攝

白冠雞

學名：*Fulica atra*

英名：Black Coot

40cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

白冠雞在台灣並不普遍，通常二、三隻出現在較大型的魚塭或湖泊的草澤附近。腳趾上的瓣蹼有利於游泳及潛水，向前游泳時會前後擺動頸、尾部且尾羽會下垂。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 白冠雞成鳥

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、身體黑灰色，體側無白斑，體態渾圓。
- 2、嘴、額板白色，腳暗綠色有瓣蹼。

白腹秧雞

學名：*Amaurornis phoenicurus*

英名：White-breasted Water Hen

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

30cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

白腹秧雞多出現於平地至低海拔的溼地、農田或溝渠等，偶爾會也會出現在草原。生性機警，不太會在離隱蔽物太遠的地方活動，一有風吹草動便迅速跑入草叢中或低空飛離。常於晨昏或夜間發出似「苦呀苦呀」的叫聲，行走時會上下翹動尾羽。



▲ 白腹秧雞行走時尾部會不停翹動

文武 攝


● 辨識特徵：

- 1、頭後至背腰部灰黑色，額、臉至胸腹部為白色，下腹部至尾下覆羽紅褐色。
- 2、嘴、腳黃綠色，上嘴基部紅色。



▲ 白腹秧雞生性害羞，大多在水邊的草叢地帶活動

黃民雄 攝



▲ 白腹秧雞較不善飛行，通常情急下才會短暫飛行

文武 攝

緋秧雞

學名：*Porzana fusca*

英名：Ruddy-breasted Crake 19cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

緋秧雞常於晨昏時刻單獨出現在平地至低海拔的水田、溼地、農田、草澤。生性隱密，警戒心強，並不容易見其現身。以水生昆蟲、軟體動物、草的種子、甲殼類為食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近




▲ 緋秧雞又稱紅胸田雞

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、後頸至背腰部暗綠褐色，額、臉至上腹部為栗紅色。
- 2、下腹到尾下覆羽有黑白色橫紋，腳紅色。



▲ 緋秧雞常在水田、溼地的草澤間活動覓食

竹間小六 攝



▲ 緋秧雞生性機警，愛獨來獨往

謝宗欣 攝



彩鷓 / 黃民雄 攝

彩鷓科

- 彩鷓科鳥類體型圓胖，雌鳥羽色鮮艷，雄鳥羽色較樸素。
- 主要棲息於沼澤、河畔、水田等溼地，以昆蟲、軟體動物、甲蟲為主食。
- 為一妻多夫制，抱卵育雛由雄鳥負責。



彩鷸

學名：*Rostratula benghalensis*

英名：Greater Painted-snipe 25cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

彩鷸有著漂亮的羽色及一雙大眼，喜歡棲息於水田、農耕地、沼澤，常小群於晨昏或夜間時候活動，白天大多隱藏在草叢中。生性隱密，受干擾時會一動也不動地伏在地面上，直到干擾解除。一妻多夫制，繁殖期時母鳥常會發出「喀、喀、喀」的求偶聲。築巢於溼地上，由雄鳥負責孵卵育雛的工作。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鵝形目

彩鷸科



▲ 彩鷸雌鳥羽色豔麗

黃民雄 攝


● 辨識特徵：

- 1、嘴長、略下彎；頭中央有一黃白色縱線，胸側至背部有一條醒目的白色寬帶。
- 2、雌鳥羽色較鮮艷，背部橄欖綠色，腹部白色。眼周圍和眼後方白色，頭頸至上胸紅褐色。
- 3、雄鳥羽色樸素，背部褐色有深淺不一的褐色及白色橫斑，眼周圍及眼後方黃白色。



▲ 彩鷸雌鳥

黃民雄 攝



▲ 彩鷸雄鳥(左)、雌鳥(右)

黃民雄 攝



▲ 雄鳥羽色樸素具保護色，在孵蛋育雛期間可減少被天敵發現的機會

黃民雄 攝



▲ 彩鷸雌鳥(左)、雄鳥(右)

黃民雄 攝




▲ 雄鳥需負責孵卵育雛的工作

黃民雄 攝



長腳鷸科

- 長腳鷸科鳥類身材高挑，雙腳細長，嘴細長，上翹或筆直。
- 主要生活在淺灘、溼地、魚塢、湖泊、水田地區，為雜食性鳥類。築巢於地面上。



高蹺鴆

學名：*Himantopus himantopus*

英名：Black-winged Stilt

36cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

紅色修長如踩著高蹺的雙腳是高蹺鴆的註冊商標，常出現在近海的沼澤、鹽田、魚塭、水田等水域，內陸的水田有時也可見其蹤跡。步行姿態緩慢而優雅，叫聲尖銳，常邊叫邊起飛。以水中的小魚、小蝦、紅蟲等為主食。台南縣市沿海有穩定的繁殖族群，並有擴張的趨勢。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 高蹺鴆紅色的長腳相當醒目

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、腳紅且修長，嘴尖而細長。
- 2、雄鳥背部黑色帶橄欖綠的光澤，喉、胸、腹至尾下白色。頭上至後頸有白色至黑色不等的顏色變化。
- 3、雌鳥大致似雄鳥，但背部黑褐色無光澤。



▲ 從近海的沼澤到內陸的水田皆可發現高蹺鴣的蹤跡

黃民雄 攝



▲ 高蹺鴣雄鳥背部藍黑色有光澤

黃民雄 攝



▲ 高蹺鷸雌鳥

黃民雄 攝



▲ 高蹺鷸幼鳥為早熟性鳥類，孵化不久即可跟著親鳥四處遊走覓食

黃民雄 攝



▲ 高跷鹬一次大約可產3~4顆蛋

黃民雄 攝

反嘴鵞

學名：*Recurvirostra avosetta*

英名：Pied Avocet

43cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

反嘴鵞因其細長上翹的嘴而得名，在台灣以台南四草的度冬數量較多且穩定，其他地區族群數量較少。多出現在魚塭、沼澤、鹽田等水域，不管是覓食或飛行，常常是集體行動。覓食方式特殊，會用上翹的長嘴在水中掃動濾食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鵞形目

長脚鵞科



▲ 反嘴鵞常成群活動

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身黑白相間，嘴細長上翹。
- 2、腳灰黑色，有蹼。





▲ 反嘴鴿飛行時背部兩側及初級飛羽的黑色斑塊特別醒目

黃民雄 攝




▲ 反嘴鴿黑白相間的羽色及上翹的嘴相當容易辨識

謝宗欣 攝



燕鴿科

- 燕鴿科鳥類嘴短扁，嘴先端向下，雙翼甚長，尾羽分叉，腳短。
- 善於飛行捕食空中的昆蟲，飛行姿態類似燕科鳥類。
- 主要棲息在海岸附近砂石地、旱田、沼澤等地帶。喜歡成群活動，以昆蟲、蜥蜴、蝸牛、種子、魚類為食。
- 於旱地上築巢，遇危險時會有擬傷的行為。



燕鴿

學名：*Glareola maldivarum*

英名：Oriental Pratincole

24cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

燕鴿喜歡棲息在翻耕後的農地、甘蔗田、海岸附近砂石地、旱地、河床，常單獨或小群出現。善於行走及飛行，飛行速度快，可以在空中捕食飛行中的昆蟲。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 燕鴿停棲在炎熱的旱田時，常會張開嘴巴散熱

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身以茶褐色為主，腹部以下白色。
- 2、嘴黑色、基部內側紅色，喉部乳黃色鑲黑色邊。
- 3、飛行時可看到翼下橙紅色的覆羽。



翼下橙紅色的覆羽

黃民雄 攝



▲ 燕鴿飛行

唐清良 攝



▲ 燕鴿交配

黃民雄 攝

鴿科

鴿科鳥類體型大致嬌小圓胖，頭頸皆短，嘴巴短直。生性較為活潑好動，喜歡成群在沙洲上行動及覓食，常以小步伐短距離快跑，跑跑停停，一邊捕食地上的昆蟲或小動物。

飛行速度快，呈直線飛行；分布於全世界，有些種類能



小環頸鴿



鐵嘴鴿

作長距離的遷徙。主要棲息在河口、水田、沙洲、沼澤地帶。

繁殖期機警敏感，築巢於空曠砂地上，受威脅時會有擬傷的行為。

* 擬傷行為：有些鳥類，例如東方環頸鴿、高蹺鴿等在繁殖期時當發現有敵人靠近時，為了掩護巢及幼鳥不要被發現，會拖曳著翅膀假裝受傷，以引開敵人對巢及幼鳥的注意，稱為「擬傷行為」。



東方環頸鴿

小環頸鴿

學名：*Charadrius dubius*

英名：Little Ringed Plover

16cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

小環頸鴿通常出現在沙洲泥灘地、草澤、水田、鹽田、旱地等地區，成單獨或小群活動，以泥灘地中的沙蠶等生物為主食。留鳥族群稀少，多棲息中南部的水域岸邊。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 小環頸鴿繁殖羽

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、頭頂、背部褐色，腹部白色，腳黃色、嘴黑色。
- 2、胸前黑色寬頸環相連不間斷。
- 3、繁殖羽頸環及過眼線顏色較深，眼周圍金黃色，頭頂有白色橫斑。



▲ 小環頸鴣非繁殖羽

黃民雄 攝



▲ 小環頸鴣繁殖羽

黃民雄 攝

東方環頸鴿

學名：*Charadrius alexandrinus*

英名：Kentish Plover

18cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

東方環頸鴿多出現在河口、潮間帶、沙洲沼澤、泥灘地或溼地附近的砂礫地，常以小碎步的方式忽走忽停，在泥灘地上覓食。繁殖期會直接築巢於砂礫地上，蛋的顏色類似小石子，因此不易發現。當巢蛋或雛鳥受威脅時，親鳥會以擬傷的行為吸引敵人的注意，以掩護蛋或雛鳥。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 東方環頸鴿雄鳥

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、胸前頸環較窄且不相連，嘴黑色，腳灰黑色。
- 2、雄鳥繁殖羽前頭頂有一塊黑色斑，頭上紅褐色，過眼線黑色。
- 3、雌鳥頭上、過眼線及頸環均為灰褐色。
- 4、頸後頭與背部羽色不相連，有白色項圈。



▲ 東方環頸鴿胸前頸環中斷不相連

黃民雄 攝



▲ 東方環頸鴿雄鳥繁殖羽

洪董 攝



▲ 東方環頸鴿雄鳥

黃民雄 攝



東方環頸鴿卵 / 謝宗欣 攝

▲ 東方環頸鴿雌鳥孵卵

黃民雄 攝

灰斑鴉

學名：*Pluvialis squatarola*

英名：Grey Plover

30cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

灰斑鴉習性似金斑鴉，但體型稍大於金斑鴉，通常零散出現於海岸、河口潮間帶、鹽田，群聚數量較金斑鴉少。以昆蟲、軟體動物為主食。

鴉形目

鴉科



▲ 灰斑鴉非繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、繁殖羽背面黑色有灰褐色斑點，從額、眉、頸側至胸側有「乙」字形白色縱帶。臉頰、喉、胸、腹部為黑色。
- 2、非繁殖羽背面灰褐色，有黑褐色斑點，羽緣灰白色，眉斑白色，腹部白色，頸至上腹部有縱斑。
- 3、飛行時翼下黑色斑塊較金斑鴉明顯。



謝宗欣 攝

金斑鴉

學名：*Pluvialis fulva*

英名：Pacific Golden Plover 24cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

金斑鴉多單獨或小群出現於海岸、河口、鹽田、沼澤，有時會大量群聚於近海的水田、溼地，以昆蟲、軟體動物為主食。行走中停頓時常會上下擺動身體，飛行及覓食姿態不急不徐，從容優雅。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鴉形目

鴉科



▲ 金斑鴉成非繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、繁殖羽背面黑色有金黃色斑點，從額、眉、頸側至胸側有「乙」字形白色縱帶。臉頰、喉、胸、腹部為黑色。
- 2、非繁殖羽背面褐色，羽緣淡金黃色，眉斑土黃色，臉頰至腹部淺褐色。



▲ 金斑鴿成鳥非繁殖羽

黃民雄 攝



▲ 成鳥繁殖羽

黃民雄 攝

鐵嘴鴉

學名：*Charadrius leschenaultii*

英名：Greater Sand Plover

22cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

鐵嘴鴉常與蒙古鴉混棲，外型亦很相似，多出現在潮間帶、河口、沙洲、海邊沼澤、鹽田等泥灘地，常數隻或小群一起活動，喜歡短距離在泥灘地上快跑。以昆蟲、甲殼類、環節動物等為主食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鴉形目

鴉科



▲ 鐵嘴鴉非繁殖羽

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、外型與蒙古鴉很相似，但鐵嘴鴉體型較大，嘴較長，繁殖羽時的橙色胸帶邊緣沒有黑色細線。
- 2、背、翼褐色，腹部及尾下白色。繁殖羽時，胸帶為橙紅色與後頸相連，過眼線黑色，額白色。

蒙古鴉

學名：*Charadrius mongolus*

英名：Lesser Sand Plover

20cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

蒙古鴉習性、外觀與鐵嘴鴉類似，但體型較小，喜歡在沙洲、泥灘地上奔跑覓食，跑跑停停，常與鐵嘴鴉等鳥類混群。以昆蟲、甲殼類、環節動物等為主食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鴉形目

鴉科



▲ 蒙古鴉成鳥繁殖羽

謝宗欣 攝


● 辨識特徵：

- 1、嘴短、黑色，腳暗色，非繁殖羽時背部灰褐色，額、眉斑、頰與喉部白色，過眼線黑褐色，腹部白色，頸部有褐色橫帶。
- 2、繁殖羽時的頭頸部及前胸出現橙色胸帶，胸帶內緣有黑色細邊。過眼線顏色加深，額及眉斑的白色不相連。



鹬科

- 鹬科各種鳥類體型相差懸殊，嘴形各異。雙翼長，尾短，略呈方形。
- 常出現在海邊灘地、河口、沙洲及沼澤、水田地帶。性群棲，覓食方式也因嘴形各不相同。



磯鷗

學名：*Actitis hypoleucos*

英名：Common Sandpiper

18cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

磯鷗常單獨出現在海岸、魚塭、河口至內陸的溪流、池畔，甚至到中低海拔山區溪流仍可見其蹤影，環境適應力強。滯留台灣時間很長，幾乎終年可見。常沿著水邊快速行走覓食，行走時常常不停上下擺動尾羽。喜歡停棲在石頭、樹枝等突出物上休息。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 磯鷗翼角上方內凹的三角形為辨識重點

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身灰褐色調為主，腹部白色，眉白色，過眼線黑褐色。
- 2、翼角上方內凹處白色為最大特徵。
- 3、叫聲為「磯--哩哩」。



▲ 磯鶉除了繁殖期及遷徙時外，大多單獨行動

黃民雄 攝



▲ 磯鶉理羽

黃民雄 攝

黑腹濱鷸

學名：*Calidris alpina*

英名：Dunlin

19cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

又稱「濱鷸」，在台灣度冬族群龐大，常成群出現在海岸潮間帶、河口沙洲、魚塭、沼澤等地區，成千成百，相當壯觀。覓食方式是碎步快速行走，並以長嘴插入泥中採食，以水生昆蟲、紅蟲、貝類、甲殼類為食。

鷸形目

鷸科



▲ 黑腹濱鷸非繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴黑色，略長且略向下彎。
- 2、全身灰褐色調，腹部白色。繁殖羽時背部轉為紅褐色，腹部中央呈黑褐色，因而得名。
- 3、飛行時，白色的翼帶相當醒目。



黃民雄 攝

長趾濱鷸

學名：*Calidris subminuta*

英名：Long-toed Stint

14cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

長趾濱鷸又稱「雲雀鷸」，體型嬌小，常單獨或成小群出現在泥灘地、鹽田、溼地、魚塭、水田等地方快步行走、覓食，常混群於其他鷸科鳥類，但生性較不怕人。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷸形目

鷸科

科



▲ 長趾濱鷸有修長的腳趾

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴黑略下彎，腳黃綠色，腳趾長，其中中趾特別長，適合在泥灘地行走；頭頂顏色較暗，有白色眉斑，背部有V字型白斑。
- 2、繁殖羽頭及背部茶褐色帶黑斑，喉胸腹部及尾下覆羽白色。非繁殖羽時全身羽色較淡，背部有褐色斑。

黃民雄 攝

彎嘴濱鷸

學名：*Calidris ferruginea*

英名：Curlew Sandpiper

19cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

彎嘴濱鷸又稱「游鷸」，通常小群出現在河口沙洲、鹽田、沼澤、魚塭、水田、溪流，常與其他鷸科鳥類一起活動。在秋過境期間因屬非繁殖羽，與其他濱鷸灰、褐色的羽色相類似，不易辨識；等到四、五月春過境時節，鏽紅色的繁殖羽讓彎嘴濱鷸在一群鷸科水鳥中特別顯而易見。



▲ 彎嘴濱鷸(游鷸)嘴長略下彎

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴黑色，細長略下彎。
- 2、繁殖羽時全身出現鏽紅色，背部有不規則黑黃白色夾雜的斑點。
- 3、非繁殖羽時背部以暗褐色為主，腹部白色。



黃民雄 攝



▲ 彎嘴濱鴣(游鴣)繁殖羽

謝宗欣 攝



▲ 彎嘴濱鴣(游鴣)繁殖羽

黃民雄 攝

紅胸濱鷸

學名：*Calidris ruficollis*

英名：Rufous-necked Stint

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

15cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

紅胸濱鷸又稱「稗鷸」，在四月下旬的春過境期會大量出現，常成大群與其他鷸科鳥類在魚塭、沼澤、鹽田、河口泥灘地等區域活動覓食，生性活潑，常可見其在泥灘地上奔跑覓食，以昆蟲、甲殼類、螺貝類、沙蠶等為主食。



▲ 紅胸濱鷸非繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、繁殖羽背面、臉至上胸紅褐色，背部有黑褐色斑點及白色羽緣。頭上至後頸、頸側及下胸有黑褐色縱斑，腹部至尾下覆羽白色。
- 2、非繁殖羽背面灰褐色，有雜斑。腹面白色，頸側、胸側有不明顯的褐色縱斑。





▲ 紅胸濱鵝喜歡成群活動

黃民雄 攝



▲ 紅胸濱鵝繁殖羽

謝宗欣 攝

尖尾濱鷸

學名：*Calidris acuminata*

英名：Sharp-tailed Sandpiper

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

19cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

尖尾濱鷸在台灣屬於普遍的過境鳥，以春季較為常見，常單獨或小群出現在沼澤、沙洲、水田、鹽田等地區，以甲殼類、昆蟲或蝌蚪為主食。繁殖羽時頭頂的紅褐色及胸前V形斑點為辨識尖尾濱鷸的重點。



▲ 尖尾濱鷸繁殖羽頭頂紅褐色，如戴著一頂小紅帽般 黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴黑色略下彎，腳黃綠色。繁殖羽時頭頂紅褐色，具黑色細縱紋，有黃白色眉斑，背部黑褐色具紅褐色及白色羽緣，胸腹以下可見V形斑。
- 2、非繁殖羽時全身羽色較淡，頰至胸有不明顯之縱斑。



▲ 尖尾濱鷸繁殖羽胸前有V形斑

寬嘴鷸

學名：*Limicola falcinellus*

英名：Broad-billed Sandpiper

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

17cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

寬嘴鷸為不普遍的過境鳥，以春季過境期較為常見。常單獨或小群出現在沼澤、鹽田、水田、沙洲、魚塭等地區，以貝類、蚯蚓、昆蟲等為主食，常混群於濱鷸等其他鷸科鳥類中。

鷸形目

鷸科

科



▲ 寬嘴鷸頭頂有西瓜皮般的斑紋

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴喙較其他鷸科鳥類寬，略長，尖端略下彎。
- 2、繁殖羽頭頂暗褐色，頭側線白色，呈現有如西瓜皮般的紋路，背部帶些許紅褐色，腹面白色，有白色眉斑及黑褐色過眼線。
- 3、非繁殖羽頭頂紋路稍淡，背部為樸素的灰褐色有白色羽緣，腹面白色。



▲ 寬嘴鴣嘴喙較寬且前端略下彎

黃民雄 攝



▲ 寬嘴鴣成鳥

黃民雄 攝

青足鷸

學名：*Tringa nebularia*

英名：Common Greenshank

33cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

青足鷸屬較大型的鷸科水鳥，單獨或小群出現在近海沼澤、潮間帶、魚塭、鹽田等。生性機警，受干擾飛離時常會發出清脆響亮的「丟、丟、丟」叫聲。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷸形目

鷸

科



▲ 青足鷸嘴喙前端略上翹

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴前端略為上翹；腳長，青灰色。
- 2、頭至後頸灰色有縱斑，背部灰褐色，有白色間黑褐色的羽緣。



▲ 青足鸕覓食

黃民雄 攝



▲ 青足鸕腳呈青灰色因而得名

黃民雄 攝



▲ 青足鴣為常見的大型鴣科水鳥

黃民雄 攝



▲ 青足鴣覓食時大多單獨行動

黃民雄 攝





青足鷺 / 黃民雄 攝

小青足鷸

學名：*Tringa stagnatilis*

英名：Marsh Sandpiper

24cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

小青足鷸多單獨或小群出現在河口沙洲、魚塭、鹽田、沼澤等水域，以小魚、小蟲、甲殼類、貝類為主食，為肉食主義者。生性活潑，叫聲為尖細的「匹、匹、匹」。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷸形目

鷸科



▲ 小青足鷸非繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、型態類似青足鷸，但嘴細長不上翹，體型較小。
- 2、繁殖羽頭、頸、胸白色但密布黑褐色縱斑，體背灰褐色有深色斑點，腳黃綠色，眉線白色。
- 3、非繁殖羽體背大致灰色且斑點褪去，頭頸胸的縱斑較不明顯。



▲ 小青足鸕非繁殖羽

黃民雄 攝



▲ 小青足鸕非繁殖羽

黃民雄 攝

黃足鷸

學名：*Heteroscelus brevipes*

英名：Grey-tailed Tattler

25cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

黃足鷸通常出現在河口沙洲、潮間帶、沼澤、珊瑚礁沿岸，以小螃蟹、小蝦、沙蠶、水生昆蟲為主食。常沿著岸邊或海堤邊覓食，漲潮時喜歡成小群在石塊、堤防、岩礁上休息。

鷸形目

鷸科



▲ 黃足鷸非繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、因腳黃色而得名；眉線白色，過眼線黑褐色。嘴灰黑色，下嘴基部黃褐色。
- 2、身體背面暗灰褐色，腹面白色。繁殖羽時，臉頰至前胸會出現黑灰色縱斑，胸與腹側有波浪形花紋。非繁殖羽時，臉、胸到腹花紋消失呈淺灰色。



黃民雄 攝

赤足鷸

學名：*Tringa totanus*

英名：Common Redshank

28cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

赤足鷸單獨或小群出現在河口、沙洲、魚塭、沼澤、鹽田，以小螃蟹、小蝦、沙蠶、水生昆蟲為主食。度冬的赤足鷸在台灣以中南部較普遍可見，北部則以春秋過境的族群為多。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷸形目

鷸科



▲ 赤足鷸繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、因腳紅色而得名；嘴橙紅色，前端黑色；眼圈白色。
- 2、身體背面茶褐色，腹面白色。繁殖羽時，背面會出現黑褐色斑紋，臉頰至前胸有黑褐色縱斑。非繁殖羽時，背面灰褐色，前胸的縱斑變得不明顯。

黃民雄 攝



▲ 赤足鶺鴒覓食

黃民雄 攝



▲ 赤足鶺鴒繁殖羽

黃民雄 攝

鶴鷗

學名：*Tringa erythropus*

英名：Spotted Redshank

33cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

鶴鷗冬、夏天羽色變化極大，在台灣有少數的度冬及春過境族群，以西南沿海較為常見。常單獨或小群於沼澤、鹽田、魚塭處覓食，以水中昆蟲、小魚蝦、軟體動物為主食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鶴形目

鶴

科



▲ 鶴鷗換羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴、腳長，繁殖羽與非繁殖羽間羽色變化甚大，繁殖羽時全身大致黑色，有白色眼圈，背部有白色羽緣，下嘴基部及腳暗紅色。
- 2、非繁殖羽時背面鼠灰色，腹面白色，下嘴基部及腳紅色。此時外觀與赤足鷗相似，但鶴鷗體型較大且嘴較細長，僅下嘴基部紅色。





鶴鷓

繁殖羽時全身大致黑色，有白色眼圈，背部有白色羽緣，下嘴基部及腳暗紅色。

鶴鷓 / 黃民雄 攝

田鷸

學名：*Gallinago gallinago*

英名：Common Snipe

27cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

田鷸常出現在收割後的稻田、沼澤、大面積的淺水溼地，單獨或二、三隻於傍晚時分活動。喜歡棲息在草叢邊，受驚擾時會在原地不動警戒，當干擾接近時會突然竄入草叢中。飛行方式特殊，是以交叉方式的「之」字形起飛。



▲ 田鷸與中地鷸、大地鷸等田鷸屬的鳥類長相極為類似，不易辨認 黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴筆直且長，頭中央有一條乳黃色的縱線，眉線亦是乳黃色，頭頂兩側的側線及過眼線為黑褐色，臉頰上有一深褐色斑。
- 2、體型圓胖腳短，背部茶褐色至深褐色，黃白色的縱線明顯。頸部到胸部黃褐色有縱紋，腹部至尾下白色，體側有橫紋。



▲ 田鴛嘴筆直且長

黃民雄 攝



▲ 田鴛動作輕緩且有保護色，因此並不容易發現牠，特別是在收割的稻田中 黃民雄 攝

鷹斑鵲

學名：*Tringa glareola*

英名：Wood Sandpiper

22cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷹斑鵲多單獨或小群出現在淡水沼澤、水田、淡水魚塭，過境時則以較大的族群出現在較內陸的溼地。常沿著灘地行走覓食，步行時會上下擺動尾部，以昆蟲、甲殼類、蚯蚓等為主食。



▲ 鷹斑鵲因背部黑褐色有白色斑點而得名

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、眉線白色，過眼線黑褐色，腳黃綠色。
- 2、繁殖羽頭至後頸灰褐色有細縱紋，臉頰至前頸、胸有黑褐色縱斑，背部黑褐色有白色斑點，腹部白色。非繁殖羽時縱斑較不明顯。



▲ 鷹斑鸕非繁殖羽

黃民雄 攝



▲ 鷹斑鸕受干擾時會連續地探頭警戒

黃民雄 攝

中杓鹬

學名：*Numenius phaeopus*

英名：Whimbrel

41cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

在春過境期間常能看到中杓鹬出現在河口、潮間帶、礁岩海岸等地區，偶爾會出現在農耕地，喜歡邊走邊覓食，會用長而下彎的嘴插入泥中或石縫中捕食螃蟹、螺貝類、昆蟲等。中杓鹬特別愛吃螃蟹，爲了讓較大的螃蟹易於吞食或是避免蟹腳刺傷喉嚨，會將螯及蟹腳甩掉或拆除。

鷸形目

鷸科



▲ 中杓鹬體型及嘴長介於大、小杓鹬間

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴長，向下彎；嘴黑褐色，但下嘴基部爲肉紅色。
- 2、全身黃褐色爲主，頭至頸部顏色較淡有黑色細縱斑，背部顏色較深有黑褐色軸斑。飛行時腰部的白色也可作爲辨識重點。
- 3、頭頂兩側有黑褐色的縱線，叫聲爲連續的「逼逼逼」聲。

黑尾鷸

學名：*Limosa limosa*

英名：Black-tailed Godwit

40cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

黑尾鷸通常單獨或小群出現在河口、沙洲、魚塭、水田、池塘等地區活動覓食，中南部有小部分的度冬族群，外觀似斑尾鷸，兩者最主要分別在於斑尾鷸嘴向上翹。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鷸形目

鷸科



▲ 黑尾鷸嘴基部紅褐色，前端黑色，細長不上翹

黃民雄 攝



黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴長而直，淺紅褐色前端呈黑色。
- 2、有白色眉斑，繁殖羽時，頭、頸至上胸羽色大致為紅褐色，腹部以下白色；非繁殖羽時，轉為淡灰褐色。
- 3、飛行時可見尾羽末端黑色及白色的翼帶。

翻石鷗

學名：*Arenaria interpres*

英名：Ruddy Turnstone

22cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

翻石鷗在台灣以春過境期間較為常見，大多出現在潮間帶、礁岩海岸、泥灘地，常常可以看見牠們成小群在灘地上走動，不斷地用嘴翻開石塊或貝殼，尋找躲藏在下面的沙蠶、螃蟹等食物。翻石鷗有一張如小丑般的花臉及花花的羽色，在鷗科鳥類中特別容易辨識。



▲ 翻石鷗有一張大花臉

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴厚短，微微上翹，體型矮胖，腳橙紅色，腹面白色，繁殖羽時羽色鮮艷醒目，背部橙紅至橙褐色，間雜黑白色斑紋，臉部及頸側亦有黑色花紋，前頸至胸黑色。
- 2、非繁殖羽時身上的橙紅色褪去，轉為黯淡的深褐色。



黃民雄 攝

紅領瓣足鵞

學名：*Phalaropus lobatus*

英名：Red-necked Phalarope

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

19cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

紅領瓣足鵞會於春季過境時成群出現在近海沼澤、鹽田、魚塭、河口、靠岸的海邊、海面上，常聚集在水面上迴旋打轉來激起水中的昆蟲及浮游生物，再用嘴啄食，所以常看到水面上有一圈圈的漣漪。

鵞形目

鵞科

科



▲ 紅領瓣足鵞非繁殖羽

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴黑色，尖細筆直；趾間有瓣膜。
- 2、繁殖期雌鳥羽色較為鮮豔，喉白色，頸紅褐色，眼上方有一白斑，臉與背部黑色，背部有橙色線斑。雄鳥頸部顏色較淺，為土黃色。
- 3、非繁殖羽時，頸部紅色褪去，頭、頸、腹面為白色，頭頂有灰色斑，眼後下方有一醒目的黑斑。背部大致為灰黑色，羽緣白色。



鷗科

鷗科可分為兩類

- 燕鷗類：體型纖長，雙翼較尖窄，嘴形尖銳，尾羽長且分叉，可衝入水中捕魚，不浮游在水面。
- 鷗類：體型肥胖，雙翼較寬長，嘴厚重呈鉤狀，尾羽呈圓形不分叉，浮游在水面或在陸地覓食。



小燕鷗

學名：*Sterna albifrons*

英名：Little Tern

28cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

小燕鷗在台灣為夏候鳥，少部份為留鳥，每年四月開始會成小群出現在海岸、河口、魚塭、沼澤等地區活動。常於空中定點振翅覓食，發現獵物後會在空中轉個小彎垂直衝入水中獵食，以魚、蝦為主食。不會在水面上浮游。每年四~七月是繁殖期，小燕鷗會成群在砂礫地上築巢、產卵、育雛。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鴿形目

鷗科

科



▲ 小燕鷗繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、頭頂至後頸及過眼線黑色，額白色。背淺藍灰色，頸胸腹為白色。
- 2、繁殖羽時嘴黃色，尖端黑色；腳橙黃色。非繁殖羽時，嘴為黑色，額白色部份範圍延伸至頭頂，腳褐色。
- 3、尾羽分岔深又長。

定點鼓翅1



黃民雄 攝

定點鼓翅2



黃民雄 攝



文武 攝

小燕鷗額頭白色，因此又稱為「白額燕鷗」。



▲ 小燕鷗常成群出現在魚塭等水域上空，不浮游於水面

黃民雄 攝

黑腹燕鷗

學名：*Chlidonias hybrida*

英名：Whiskered Tern

25cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

每逢春秋兩季過境，黑腹燕鷗會出現在河口、沼澤、魚塭、池塘，成小群活動，但偶爾會以大群的方式出現。以魚、蝦為主食，覓食動作敏捷，可由空中直接俯衝水面捕食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鴿形目

鷗科

科



▲ 黑腹燕鷗繁殖羽

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、繁殖羽時，嘴暗紅色，腳紅色，頭上至後頸黑色，喉至頸側白色。身體灰色為主，前胸至腹面顏色較黑為灰黑色，有些呈黑色塊斑，尾下覆羽白色。
- 2、非繁殖羽時，嘴、腳黑色，全身以淡灰色為主，頭頸至前胸為白色。頭頂有黑色縱斑，頭後有黑斑與眼後黑斑相連。



▲ 黑腹燕鷗換羽

謝宗欣 攝



▲ 黑腹燕鷗非繁殖羽

黃民雄 攝

白翅黑燕鷗

學名：*Chlidonias leucopterus*

英名：White-winged Black Tern

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

25cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

白翅黑燕鷗與黑腹燕鷗同為過境鳥，過境時常成群聚集出現於河口、魚塭、池塘、潮間帶、水田、水庫上空等地區，以魚蝦、昆蟲等為主食，常飛行於水面上找尋食物，發現獵物後俯衝入水捕食。白翅黑燕鷗與黑腹燕鷗非繁殖羽時外觀極為類似，可由眼後黑斑來判斷：黑腹燕鷗眼後黑斑與眼線平行一直線連貫；白翅黑燕鷗眼後黑斑較大且超過眼下。

鴿形目

鷗科

科



▲ 白翅黑燕鷗非繁殖羽

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、繁殖羽時頭部、胸腹部皆為黑色，飛行時可見翼下前半段亦為黑色，嘴、腳為紅色。
- 2、非繁殖羽時，羽色以白色為主，僅剩下頭頂、後頸及耳斑（低過眼睛下方）呈現暗灰色，嘴及腳分別轉為黑色、灰褐色。



▲ 白翅黑燕鷗非繁殖羽

唐清良 攝



▲ 白翅黑燕鷗覓食

唐清良 攝



▲ 白翅黑燕鷗非繁殖羽

唐清良 攝



▲ 白翅黑燕鷗非繁殖羽

唐清良 攝

裏海燕鷗

學名：*Sterna caspia*

英名：Caspian Tern

53cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

裏海燕鷗為大型的燕鷗，具群聚性，多出現在河口、海岸、潮間帶、沼澤等大型開闊水域，以魚類為主食，常會在水面上飛行覓食，可定點振翅再衝入水中捕食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鴿形目

鷗科



▲ 裏海燕鷗為大型的鷗科鳥類

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴長且粗厚，嘴紅色，先端黑色，腳黑色。
- 2、背部灰色，頭、頸至胸以下白色。
- 3、繁殖羽時頭頂至後頸為黑色，且有不明顯冠羽。非繁殖羽時，頭頂黑色減少且出現白色斑紋。



▲ 裏海燕鷗粗厚、紅色的嘴喙特別醒目

黃民雄 攝



▲ 裏海燕鷗常群聚出現

黃民雄 攝

鳳頭燕鷗

學名：*Sterna bergii*

英名：Greater Crested Tern 45cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

鳳頭燕鷗多出現在海岸岩礁、河口、島嶼、漁港，常成群出現。覓食方式為先在水面巡航，然後直接從空中俯衝入水捕食，以魚蝦為主食。在台灣是局部普遍的夏候鳥，以東北角較為常見，留鳥族群則在澎湖及馬祖。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



鳳頭燕鷗繁殖羽 / 黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴黃色，腳黑色，背部灰色，翼尖黑色，喉、頸、胸、腹皆為白色。尾羽灰色，略分岔；展翅時翼上覆羽灰色。
- 2、繁殖羽時，眼上方的前頭至後頭為黑色，頭後有冠羽。
- 2、非繁殖羽時，全身大致似繁殖羽，但頭頂黑色部份出現白色細斑。



▲ 鳳頭燕鷗繁殖羽

黃民雄 攝



▲ 鳳頭燕鷗會由高空俯衝入水捕食

黃民雄 攝

紅嘴鷗

學名：*Larus ridibundus*

英名：Black-headed Gull

40cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

紅嘴鷗多出現在港灣、潮間帶、河口、大型沼澤、魚塭等，生性喧嘩，喜歡群聚，會群飛在水面上找食物並衝入水中啄食，或浮游於水面、步行撿食的方式覓食。常站在沙洲、水面突出物或浮游在水面休息。

鴿形目

鷗科



▲ 紅嘴鷗非繁殖羽，眼後有一黑斑

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、背部灰色，體下白色，初級飛羽尖端黑色。
- 2、繁殖羽時，頭及臉為黑褐色，嘴、腳暗紅色，眼圈白色。
- 3、非繁殖羽時，頭及臉的黑褐色褪去轉為白色，但眼後有一明顯的黑斑。嘴、腳紅色，嘴前端略有黑色。



▲紅嘴鷗非繁殖羽

黃民雄 攝



▲紅嘴鷗非繁殖羽

黃民雄 攝



鳩鴿科

- 鳩鴿科鳥類通常體型肥胖、頭小、頸腳皆短，嘴細，先端呈鉤狀。
- 以植物種子、果實爲主食。喜歡漫步於草地或樹林下覓食。
- 雌雄皆會抱卵，育雛時會將食物半消化成乳狀之鴿乳，再吐出餵養幼雛。



紅鳩

學名：*Streptopelia tranquebarica*

英名：Red-collared Dove

23cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

普遍易見的鳥類，常數隻或成群出現在鄉間、農地、開闊地、樹枝、電線、草坪等。常在地面行走覓食，以植物的果實、種子、嫩芽為主食，也常成群排排站在電線或枝頭上休息。叫聲為連續的「咕-咕-咕」，是台灣可見鳩鴿科鳥類體型最嬌小的。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雄鳥



雌鳥



▲ 在樹林下、草地上常可看到紅鳩夫妻相偕覓食

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、雄鳥頭至頸部鼠灰色，身體磚紅色，飛羽及尾羽黑褐色，後頸有黑色頸環。
- 2、雌鳥全身褐色為主，後頸也有黑色頸環，但頸環邊緣有些微白色。

斑頸鳩

學名：*Streptopelia chinensis*

英名：Spotted-necked Dove

30cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

又稱「珠頸斑鳩」，因頸部的白色斑點而得名。多出現在平地至低海拔的平原及丘陵、開墾地，適應力強，因此一般在校園、公園等也可發現斑頸鳩的蹤跡。常成對或數隻在地面上邊走邊覓食，以植物種子或昆蟲為食。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

有白色珠狀斑點的黑頸帶



黃民雄 攝



黃民雄 攝

● 辨識特徵：

全身以灰褐色為主，腹部略紅，頭頂灰色，後頸至頸側黑色間有白色珠狀斑點。

鴿子

學名：*Columba livia*

英名：Rock Dove

23cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化



鴿子為都市公園綠地、校園、近郊附近常見的籠中逸鳥，主要是臺灣盛行飼養的賽鴿所逃逸野生的，以果實、種子、穀類為主食，常會在大樓等建築物的窗台、冷氣機棲息及築巢。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近



▲ 鴿子的羽色花紋有相當多樣的變化

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、體型肥胖，頸、腳皆短，腳紅色，羽色花紋多樣，無頸環。
- 2、嘴細，先端呈勾狀，鼻孔有白色臘膜覆蓋著。



杜鵑科

- 杜鵑科鳥類是著名的托卵性鳥類，有些種類不築巢亦不育雛，會將卵托生在各種鳥類的巢中。
- 體型修長，大多雌雄同色，嘴先端向下，尾長。
- 主要棲息在樹林或草原，通常單獨活動，以爬蟲類、小動物或果實為主食。



番鵲

學名：*Centropus bengalensis*

英名：Lesser Coucal

39cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

番鵲大多棲息在平地至低海拔灌叢、草叢、旱田、曠野、甘蔗田中，喜歡停棲在突出的甘蔗枝、樹枝等，生性隱密，常會在下層樹叢或草叢間做短距離飛行。以昆蟲、爬蟲類為主食，築巢於灌叢中，巢形為圓球形。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

鵲形目

杜鵑科



▲ 番鵲繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、繁殖羽與非繁殖羽落差很大：繁殖羽背及翼栗褐色，身體大致黑色稍帶綠色光澤。非繁殖羽全身大致為黃褐色，羽軸黃白色，呈縱斑狀。尾羽外側黑色，內側褐色有黑色橫斑。
- 2、叫聲為「嗶、嗶、嗶」。



▲ 番鵲飛行

洪董 攝



▲ 番鵲喜歡站立在突出的柱子、樹枝上

洪董 攝



- 外型類似燕科鳥類，但其尾羽無分叉或分叉較淺。
- 雙翼修長如鐮刀形，飛行力強，飛行時雙翼快速交互鼓動。
- 多數時間於空中不斷飛行，腳短無力，落地便無法以本身的力量起飛，所以通常不停棲，只有在必要時會攀附在壁上。
- 以昆蟲為主食，能巧妙捕食飛行中的昆蟲。

小雨燕

學名：*Apus affinis*

英名：House Swift

14cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

小雨燕多出現於平地至低海拔地區，偶爾會出現在中高海拔的上空，通常成群於天空中繞飛，捕食飛行中的昆蟲，且會發出吵雜的叫聲。雙腳退化無力，因此只能用鉤掛在屋簷、石壁、橋樑上的方式休息。築巢於沙質岩壁、建築物、隧道、橋樑、山洞中。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近



▲ 小雨燕白天大多數的時間都在空中不斷飛翔

黃嘉隆 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身黑褐色為主，喉及腰為白色。
- 2、尾羽不分叉，稍向內凹，張開如扇形；飛行時羽翼呈鐮刀形。



翠鳥科

- 小至中型水邊鳥類，羽色繽紛豔麗，頭略大，尾、腳短，嘴粗厚有力，以魚、蛙、爬蟲類、昆蟲為主食。
- 飛行速度快，常貼近水面筆直飛行，且邊飛邊發出尖銳之叫聲。
- 喜佇立於枯枝或岩石上等待獵物，發現獵物時會在空中定點振翅，俯衝向下捕食。
- 以岸邊泥土或朽木築洞為巢。



翠鳥

學名：*Alcedo atthis*

英名：River Kingfisher

16cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

捕魚技術高超的釣魚翁，多出現在平地至低海拔的河川、溪流、池塘、湖泊、溝渠等，喜歡佇立在水邊的枝頭或岩石，伺機而動，在發現獵物會迅速衝入水中捕食；也會在空中定點振翅，再急衝入水中捕食。生性機警，受驚擾時會貼近水面直線飛離，且會發出尖銳的「唧」聲。以挖洞的方式將巢築於溝渠或池塘等岸邊土壁。

雄鳥



雌鳥



雌鳥下嘴喙紅色



唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、頭、頸及背部大致為有光澤的藍綠色密佈淺藍色的斑點，背部中央至尾羽的亮藍色特別顯眼。喉白色，眼下、胸、腹部至尾下為橙色。
- 2、尾、腳皆短，腳紅色。嘴長，雄鳥上下嘴喙皆為黑色，雌鳥下嘴喙紅色，彷彿塗了口紅一樣。



▲ 翠鳥捕魚技術高超，又稱「釣魚翁」、「魚狗」。

黃民雄 攝

雌鳥(左)
雄鳥(右)



求偶、獻禮



交配

黃民雄 攝



▲ 翠鳥會在潮溝、魚塭的土岸挖洞築巢

▼ 翠鳥幼鳥



黃民雄 攝



親鳥(左為雌鳥)餵食幼鳥(右) / 唐清良 攝





雲雀科

- 嘴長，嘴鋒稍下彎；後趾爪特長，有冠羽。
- 棲息於旱田、草原、山區空曠地帶，主要在地上覓食、行動，以種子、昆蟲為主食。
- 在地上活動或空中飛翔時，常發出鳴聲。



小雲雀

學名：*Alauda gulgula*

英名：Oriental Skylark

15cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

因常於空中定點振翅，俗稱「半天鳥」。多出現在空曠的草地、荒地、旱田，大多在地面上活動、覓食；繁殖期求偶或鳴唱時，能垂直飛上天空在定點鳴叫許久；築巢於地面草叢中。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近



▲ 小雲雀後爪特別長

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、冠羽黑褐色。全身以黃褐色為主，在草地中時形成最佳的保護色；背部及雙翼有黑褐色軸斑及淡色羽緣，頸側、胸有褐色縱斑，眉線黃白色。
- 2、另一亞種「澎湖雲雀」體色較偏黃褐色

黃民雄 攝



▲ 小雲雀繁殖期時有飛到空中定點鳴唱宣示領域的行為

黃民雄 攝



▲ 小雲雀有黑褐色冠羽

洪董 攝



燕科

- 燕科鳥類體型修長，雙翼狹長而尖，尾羽分叉。
- 飛行速度快，飛行技巧高超且優雅，經常成群盤旋於空中捕食飛蟲。腳短無力，偶爾可見棲坐於電線上。



洋燕

學名：*Hirundo tahitica*

英名：Pacific Swallow

14cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

洋燕多出現在平地至低海拔都市、村莊、農地、池塘、河床的上空或電線上，飛行技巧高超，速度快，擅長在空中捕食飛蟲。築巢於橋樑下或屋簷、騎樓的牆壁，巢材以泥土及草莖為主。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 洋燕上胸無黑色環，有別於家燕

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、背面黑色帶有藍色光澤，額、頰至上胸為銹紅色，腹部灰褐色。
- 2、尾短，分叉小，尾羽下有白斑。
- 3、體型較家燕小，上胸無黑色環，且尾羽分叉較短。



▲ 洋燕停棲

黃民雄 攝



▲ 洋燕銜泥

黃民雄 攝

家燕

學名：*Hirundo rustica*

英名：Barn Swallow

17cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

家燕為遷徙性鳥類，出現在平地至低海拔的平原、丘陵各種環境中，常在空中不停飛翔，張嘴捕食飛行中的昆蟲。常築巢於住家的屋簷下，巢為半碗狀。五至九月是過境期，過境族群會在甘蔗田或電線上夜棲，數量龐大，可達數千至數萬隻。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

燕科



黃民雄 攝

▲ 家燕築半碗狀的巢於屋簷下

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、背面黑色帶有藍色光澤，額、喉及上胸為紅褐色，腹部白色。
- 2、上胸有黑色環，尾羽分叉很深，尾羽下有白斑。



▲ 家燕

黃民雄 攝



▲ 家燕親鳥餵食幼鳥

黃民雄 攝

赤腰燕

學名：*Cecropis striolata*

英名：Greater Striated Swallow

19cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

赤腰燕台灣燕科鳥類中體型最大的，多出現在平地、旱田、溪床，甚至一般巷弄。飛行姿態強勁，以啄食空中的飛蟲為主食。喜歡築巢於騎樓、屋簷下，以泥土、草莖築成半碗狀結合蜿蜒隧道的較為封閉的巢。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 赤腰燕飛行

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、背面黑色，帶有藍色光澤；腰部紅褐色；尾羽分叉深，像支剪刀一樣。
- 2、喉、胸至腹部黃白色密佈黑色縱斑；眉斑長，延伸至眼後，顏色為紅褐色。



▲ 赤腰燕停棲

謝宗欣 攝



▲ 赤腰燕瓶口狀的巢

謝宗欣 攝

棕沙燕

學名：*Riparia paludicola*

英名：Plain Martin

10cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

棕沙燕為台灣常見燕科鳥類中體型較小的，常成群飛行於魚塭、河床上捕食昆蟲，或停棲於電線上休憩，有集體於河邊土堤或砂質峭壁中挖洞築巢的習慣。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 棕沙燕體型嬌小，全身以灰褐色為主

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、背面灰褐色，喉至胸為污白色，腹部白色。
- 2、尾短，呈略向內凹的魚尾形。



鶺鴒科

- 鶺鴒科鳥類的體型纖細修長，有些種類尾羽甚長。
- 常棲息於平地草原、農耕地、海濱、河畔、沼澤地等，以昆蟲為主食。
- 停棲時或在地上行走時，尾羽會一上一下擺動；飛行時呈波浪狀，且喜歡邊飛邊叫。



黃鵲鴝

學名：*Motacilla flava*

英名：Yellow Wagtail

17cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

黃鵲鴝在台灣有兩亞種：白眉黃鵲鴝與黃眉黃鵲鴝，主要差別在於眉斑顏色。常見於平地至低海拔水域地帶、空曠草原、樹林、農耕地，多在地面活動，以昆蟲為主食。常快步行走，停棲時會不停地上下擺動尾羽；飛行路線呈大波浪狀，且會伴隨「唧、唧、唧」的叫聲。

雀形目

鵲鴝科



▲ 黃眉黃鵲鴝繁殖羽

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、眉斑黃色/白色，腳灰黑色，尾長，嘴細。
- 2、繁殖羽時，背面橄欖綠色，腹部黃色。
- 3、非繁殖羽時，背面灰褐色，腹部灰白色略帶黃色，眉斑黃色變得較淡。



▲ 白眉黃鶺鴒繁殖羽

黃民雄 攝



▲ 白眉黃鶺鴒非繁殖羽

黃民雄 攝





白眉黃鵲繁殖羽 / 謝宗欣攝

白面白鵲鴿

學名：*Motacilla alba*

英名：White Wagtail

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

19cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

白鵲鴿在台灣有四個亞種，其中白面白鵲鴿在台灣有留鳥族群，其餘均為冬候鳥。多出現在水域、農耕地或住家附近，常在地面走動啄食昆蟲，停棲時會不停擺動尾羽，飛行時呈波浪狀，且邊飛邊發出「唧、唧、唧」的叫聲。早期農業時代，因常會出現於牛糞邊捕食寄生蟲或昆蟲，因此又被稱為「牛屎鳥」。有集體棲息過夜的習慣。



▲ 白面白鵲鴿臉部羽色純白

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、身材纖細修長。
- 2、臉的部份為純白色，沒有過眼線，頭頂至背部及胸前為黑色，其餘部份為白色，全身黑白分明。



▲ 白面白鶺鴒成鳥

黃民雄 攝



▲ 白面白鶺鴒成鳥

黃民雄 攝

灰鵲鴿

學名：*Motacilla cinerea*

英名：Grey Wagtail

18cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

灰鵲鴿喜歡在平地至中低海拔溪流、水域等潮濕地帶或農耕地、公路旁活動，除遷徙時會集體出現，其餘時間多單獨活動。常行走在地上啄食地面的昆蟲，停棲時會不停上下擺動尾羽，飛行呈波浪狀，並發出「唧、唧、唧」的叫聲。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 灰鵲鴿常出現在中低海拔山區的溪流、水域

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、身材纖長，頭至背部灰色，有白色眉斑，胸至腹部黃色，翼及尾羽黑褐色。
- 2、外觀似黃鵲鴿，但腳為黃褐色。



▲ 灰鶺鴒腳為黃褐色

黃民雄 攝



▲ 灰鶺鴒停棲時常上下擺動尾羽

黃民雄 攝



鶇科

- 鶇科鳥類通常嘴先端略下彎，嘴邊有剛毛，以昆蟲、植物果實為主食，尤其愛吃各類無花果、漿果，所以常可在長有果實的樹上發現蹤跡。
- 除了繁殖期外，平時喜歡成群活動起飛，喧鬧好動，吵嚷不休。



白頭翁

學名：*Pycnonotus sinensis*

英名：Chinese Bulbul

18cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

白頭翁出現在平地至中海拔的樹林、村落、公園，是極為常見的鳥類，常成小群活動，最喜歡吃漿果、植物嫩芽及昆蟲。叫聲嘹亮富變化，音似「七古力、七古力」，喜歡高倨枝頭鳴唱。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塢
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

鶇科



▲ 白頭翁因頭後的白色羽毛而得名

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、頭至後頸黑色，頭後部份有一大白斑為最明顯特徵，也因此名為「白頭翁」，又稱「白頭殼仔」。
- 2、身體背面橄欖綠色，喉、腹部白色，眼後有一白斑，前胸略帶灰褐色。



白頭翁幼鳥 / 謝宗欣 攝



▲ 白頭翁雛鳥

謝宗欣 攝 有棕紅色污斑的蛋



▲ 親鳥餵食幼鳥

謝宗欣 攝



▲ 白頭翁成鳥

唐清良 攝



▲ 白頭翁成鳥

謝宗欣 攝



伯勞科

- 中小型肉食性鳥類，常獨來獨往。
- 嘴尖端向下如鷹嘴，以昆蟲、爬蟲類、小型動物為主食。
- 喜歡停棲於突出醒目的枝頭、木樁上，伺機獵食。將剩餘食物串掛於樹木枝桠上，為本科鳥類較為特殊的貯食行爲。



紅尾伯勞

學名：*Lanius cristatus*

英名：Brown Shrike

18cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化



謝宗欣 攝

紅尾伯勞於秋天過境台灣或至台灣度冬，多單獨活動於平地或丘陵的農地、空曠處、森林邊緣，地域性強。喜歡高立在枝頭或木樁，繞動著尾羽，伺機捕食昆蟲、青蛙或蜥蜴，且會將獵物掛於枝頭以貯食或以利於撕裂食物。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



每年秋過境期間，紅尾伯勞會大量出現在恆春半島，但是卻常遭違法的民眾以「鳥仔踏」捕捉烤食，對紅尾伯勞的族群造成很大的傷害。

▲紅尾伯勞雌鳥兩脅有鱗狀斑紋

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴粗短且尖端下鉤，有如眼罩般的黑色過眼帶。
- 2、頭及背部灰褐色至紅褐色，喉白色，胸腹以下淡黃褐色。雌鳥及亞成鳥在胸部及腹部兩側有明顯的鱗狀紋。



嘴基部有剛毛

棕背伯勞

學名：*Lanius schach*

英名：Long-tailed Shrike

25cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

棕背伯勞為台灣的特有亞種鳥類，多單獨出現在平地的草原、農耕地、疏林等較開闊的地方，喜歡佇立在高枝或木樁上伺機捕食，覓食習性與紅尾伯勞相似，擅長模仿其他鳥類的叫聲。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近



▲ 棕背伯勞喜歡站立在獨立的枝頭上

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、體型較紅尾伯勞大，頭至上背灰色，有涵蓋前額的黑色過眼帶，下背至尾羽前端有鮮豔的橙黃色，翼黑色且有一明顯白點。
- 2、嘴粗短、先端向下鉤。



▲ 棕背伯勞為台灣伯勞科鳥類中唯一的留鳥

黃民雄 攝



▲ 棕背伯勞的過眼帶寬黑醒目

黃民雄 攝



大卷尾/黃民雄 攝

卷尾科

- 卷尾科鳥類嘴鋒彎曲有力，羽色單純，尾羽長而分岔，且末端略為向上捲起。
- 翼長，飛行能力甚強，速度又快。
- 生性好鬥，常追逐或攻擊其他鳥類。以昆蟲為主食。



大卷尾

學名：*Dicrurus macrocercus*

英名：Black Drongo

30cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

大卷尾又名「烏秋」，多出現在平地至低海拔的農耕地、樹林、電線、牛背、竹林，常站立在電線、樹枝上層或突出物上晃動著尾巴，等待時機，一發現昆蟲便迅速起飛直撲，飛行技巧相當高超。鄉間正在翻耕的農地，特別能見到大卷尾成群聚集在附近等待捕捉因翻土而驚飛的昆蟲。繁殖育雛期領域性強且生性特別兇猛，連大型猛禽都可不畏懼地追趕，甚至會追逐啄擊路過的行人。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近



▲ 大卷尾全身黑色帶有光澤感

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身黑色，有光澤感；尾羽長且分叉深，狀似魚尾且微微上翹。嘴、腳均為黑色。
- 2、叫聲為響亮的「啾---卡噤--啾---卡噤」。



▲ 大卷尾為台灣特有亞種鳥類

謝宗欣 攝



▲ 大卷尾亞成鳥

黃民雄 攝



八哥科

- 八哥科鳥類嘴喙直長而尖，尾短，為小至中型陸棲性鳥類。
- 生性喜歡群棲，主要生活於曠野、樹林及市區，屬雜食性鳥類。
- 個性聒噪凶悍，叫聲變化多端，有些種類擅長模仿其他鳥類的叫聲。
- 本科鳥類是近年來外來種問題嚴重的代表性物種之一，如家八哥和白尾八哥因環境適應力強，大量繁衍，嚴重威脅到本土留鳥「八哥」的生存空間。



八哥

學名：*Acridotheres cristatellus*

英名：Crested Myna

26cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

八哥為台灣特有亞種鳥類，常成群出現在平地至低海拔的農耕地、空曠地、村落附近，停棲在電線或屋頂上。雜食性，常會在垃圾堆中覓食。近年來因引進許多外來種八哥，棲地受到嚴重威脅，造成生存競爭及雜交種的出現，以致台灣原生的八哥數量大幅減少，野外已不易見到。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 八哥的嘴喙為象牙白色，上嘴基部有簇生的毛

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身藍黑色有光澤，嘴喙象牙白色，腳黃色，上嘴喙基部有豎起的黑色羽毛。
- 2、尾羽末端白色，尾下覆羽黑色間有白色橫紋，翼上有一白斑。

家八哥

學名：*Acridotheres tristis*

英名：Common Myna

24cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

家八哥為引進的外來種逸鳥，目前已非常普遍，在農耕地、住家附近、都會地區皆可見；常在草地或垃圾堆中覓食，屬雜食性。生性不甚怕人，叫聲響亮聒噪。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雀形目

八哥科



▲ 家八哥眼部周圍可見裸露的黃色皮膚，且嘴上無豎起的毛 黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、身體褐色，頭灰黑色，嘴、腳黃色；眼部周圍無羽毛為黃色的裸露皮膚。
- 2、下腹部、尾下覆羽白色，翼上有白斑。



▲ 家八哥生性聒噪嘈雜

黃民雄 攝



▲ 家八哥喜歡成群活動

黃民雄 攝

白尾八哥

學名：*Acridotheres javanicus*

英名：White-vented Myna

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

22cm

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

外來種，是籠中逸鳥，目前在台灣亦大量繁衍。出現在平地至低海拔的住家附近、開闊樹林地帶、農耕地、公園、路邊等，常群聚在枝頭或電線，叫聲聒噪吵雜，且擅模仿。以果實或昆蟲為食，常見到白尾八哥在地面上或田裡捕食昆蟲。



▲ 白尾八哥嘴喙為黃色

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴、腳黃色，全身灰黑色，頭部顏色較深，翼下有白斑，尾下覆羽及尾羽末端白色，上嘴喙基部有豎起的黑色羽毛。



▲ 白尾八哥時常於地面上覓食

黃民雄 攝



▲ 白尾八哥為強勢的外來種

謝宗欣 攝

鵯科

- 鵯科鳥類大多嘴細長、腳強健，有些擅於在地面奔跑、跳躍，有些擅於飛行於枝頭活動。每到秋冬時期，鵯科鳥類的候鳥及過境族群總是悄悄登陸，低調又神秘。



- 鵯科鳥類特別喜歡吃昆蟲及植物的漿果及種子，常穿梭在樹林間或草叢底層覓食。

赤腹鵯/黃民雄 攝



赤腹鶇

學名：*Turdus chrysolaus*

英名：Brown-headed Thrush 22cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

赤腹鶇在台灣出現的範圍相當廣，從平原至低中海拔的混合林皆有機會看到他們的身影，平時大多單獨於地面或樹叢底層活動、覓食，喜歡停棲於空曠處的突出物，叫聲為尖細拉長的「茲-茲-」聲，飛行速度快且技巧高超；以果實、昆蟲為主食，山桐子、雀榕果熟時，可見赤腹鶇與其他鳥類穿梭枝梢間大快朵頤。過境遷徙時期會與其他鶇科鳥類成群出現。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 山桐子美味的果實常吸引赤腹鶇光臨

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身羽色以橄欖褐色為主，胸部及腹部兩側紅褐色，下胸以下為白色。
- 2、雌鳥羽色略淡。



黃民雄 攝



鶇科

- 鶇科鳥類體型由小型至中型不等，姿態挺拔，聲音婉轉嘹亮，善於鳴叫。
- 鶇科鳥類主要棲息於樹林、草叢或林緣陰濕地帶，多數善於在地面活動，以昆蟲或果實為主食。



藍磯鶇

學名：*Monticola solitarius*

英名：Blue Rock Thrush

21cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

藍磯鶇大多單獨出現在平地至中海拔的空曠地帶，常站立在海岸礁石、屋角、木樁、水泥塊等突出物。停棲時姿勢挺直，會上下擺動尾羽，以昆蟲、植物種子等為食。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

鶇科



▲ 藍磯鶇雄鳥

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、雄鳥頭、頸、上胸、背面大致為深藍色，下胸、腹部為紅棕色，翼、尾羽黑色。
- 2、雌鳥背面灰褐色略帶藍色，有淡色羽緣；腹面黃褐色，具鱗狀細紋。



▲ 藍磯鸚常出現在海岸礁石地帶

黃民雄 攝



▲ 藍磯鸚雌鳥

竹間小六 攝

野鵪

學名：*Erithacus calliope*

英名：Siberian Rubythroat

16cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

野鵪常單獨出現在開闊地或河床的灌叢、芒草、農耕地中，生性隱密，多在密叢底層活動。但在春季北返前，因接近繁殖季，雄鳥常會站上枝頭鳴唱，唯有此時較易被發現。叫聲響亮悠揚，有一副好歌喉，因此也稱「紅喉歌鵪」。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塢
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 野鵪又稱「紅喉歌鵪」

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、頭、頸至背面大致為橄欖褐色，眉線及顎線白色，眼先黑色，腹部及尾下淺褐色至白色。
- 2、雄鳥喉部為鮮豔的紅色有細黑框；雌鳥喉部白色，有時略帶粉色。



唐清良 攝



▲ 野鶇雄鳥，紅色的喉部像掛著紅色領巾

唐清良 攝



▲ 野鶇雌鳥

黃民雄 攝

黃尾鵯

學名：*Phoenicurus auroreus*

英名：Daurian Redstart

15cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

黃尾鵯大多單獨出現在平地至中海拔空曠樹林或草叢、農耕地地帶，常在地面附近追捕飛蟲，特別喜歡停坐突出枝頭上，以方便覓食飛行經過的昆蟲，停棲時常會上下的擺動尾巴。

雀形目

鶇科



▲ 黃尾鵯雌鳥，全身以灰褐色為主，尾羽及腰橙紅色

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、雌雄外表差異大，雄鳥頭頂至後頸銀灰色；嘴、臉、背、翼黑色，翼上有塊明顯白斑，胸腹為黃褐色；尾羽紅褐色，中央尾羽黑色。
- 2、雌鳥較為樸素，全身大致為灰褐色，只有尾羽外緣及腰為橙色，翼上也有塊較小的白斑。



唐清良 攝



▲ 黃尾鷓雄鳥

黃民雄 攝



▲ 黃尾鷓雄鳥

黃民雄 攝

綠繡眼 / 謝宗欣 攝



繡眼科

- 嘴細長尖銳，多數種類眼周圍有一圈白色的細毛。
- 以花蜜、昆蟲、植物果實為主食，棲息於樹林，喜歡成群穿梭跳動於樹林枝桠間。
- 築巢於樹上，常在枝桠分岔處築成酒杯狀鳥巢。

綠繡眼

學名：*Zosterops japonica*

英名：Japanese White-eye

11cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

綠繡眼體型嬌小，爲了自保常群體活動，平地至中低海拔的樹林、公園、住家附近皆可發現綠繡眼小巧可愛的身影穿梭在枝椏間尋找昆蟲、吸吮花蜜、果實，特別喜愛蜜源植物的花朵，如木棉、刺桐，偶爾可見綠繡眼倒懸著身體吸食花蜜的特技。個性活潑好動，會發出「啾-啾」細碎的叫聲。

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

雀形目

繡眼科



謝宗欣 攝

▲ 綠繡眼是都市公園常見的鳥類

● 辨識特徵：

- 1、體型嬌小，全身大致黃綠色。
- 2、眼周圍有一圈白眼圈，爲最顯眼特徵，也是「綠繡眼」名稱由來。

綠繡眼精緻小巧、酒杯狀的巢，直徑約在10公分以內



謝宗欣 攝



▲ 綠繡眼互相理羽

唐清良 攝



▲ 綠繡眼幼鳥

唐清良 攝



▲ 綠繡眼俗稱「青啼仔」

唐清良 攝



▲ 綠繡眼特別喜愛蜜源植物的花朵，圖為木棉

唐清良 攝

麻雀科



- 嘴巴粗厚呈圓錐形，可以輕易地將具有硬殼的穀類種子咬碎食用，以植物種子、果實、昆蟲為主食。
- 腳短而有力，常雙腳齊跳，翅膀圓而短，鳴叫聲為單調之唧唧聲。
- 喜歡成群覓食、行動。常棲息於住家附近及郊野荒地，以草類築巢於樹上或洞穴中。



麻雀 / 謝宗欣 攝

麻雀

學名：*Passer montanus*

英名：Eurasian Tree Sparrow

14cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

麻雀廣泛分佈在平地至中海拔人類住家附近及農耕地、田野，是極為普遍可見的鳥類，在都市亦適應良好。群聚性活動，生性吵雜，以草籽、穀類、小昆蟲為食。喜歡在沙地上做沙浴，以去除身上的寄生蟲。



沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近



▲ 麻雀臉頰上有黑斑

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴短粗呈圓錐形，臉上有一明顯黑斑。
- 2、頭至後頸暗紅褐色，背部黃褐色密佈黑褐色縱斑，腹部灰白色。



梅花雀科

- 小型鳥類，嘴粗短，羽色多變，從黑褐色到鮮艷的紅、綠、藍色不等。
- 多棲息於開闊的草地、農田、郊野，常成群活動覓食，以草籽、穀物及昆蟲等為食。
- 本科鳥類的許多鳥種因為羽色豔麗而受養鳥人喜愛，再加上常遭放生，所以逸鳥特別多。



斑文鳥

學名：*Lonchura punctulata*

英名：Nutmeg Mannikin

11cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

斑文鳥常成小群或大群出現在平地至低海拔山區
的開闊樹林、農田、草原、灌叢，以草籽、植物種子
為主食，叫聲為輕柔的「啾、啾、啾…」，又稱「黑
嘴筆仔」。會以草莖、細葉為巢材築巢於灌叢或密葉
中。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近



▲ 斑文鳥喜愛在大熱天時洗個清涼的澡

竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴鉛黑色，粗厚呈圓錐形。
- 2、頭至背面、尾羽為褐色，胸、腹部為淺灰色密佈褐色鱗狀斑紋。



▲ 斑文鳥胸腹部有明顯的鱗狀斑紋

黃民雄 攝



▲ 斑文鳥粗厚的嘴特別適合吃穀類、草籽

謝宗欣 攝

白腰文鳥

學名：*Lonchura striata*

英名：White-backed Munia

11cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

白腰文鳥喜歡成群在平地至低海拔山區開墾地、農耕地、道路邊坡的灌叢或芒草叢中活動，以種籽、穀類為主食。因尾羽中央尖長，又稱「尖尾文鳥」。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塢
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

梅花雀科



▲ 白腰文鳥最大特徵為腰腹部呈白色

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身大致黑褐色，有淺色縱斑，頭部、翼、尾羽的顏色較深。
- 2、腰、腹部的白色相當醒目，為最顯著特徵。
- 3、上嘴黑色，下嘴鉛色，腳黑色。



黃民雄 攝

黑頭文鳥

學名：*Lonchura malacca*


英名：Chestnut Mannikin

10cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

黑頭文鳥多出現在低海拔山丘、草原、野地、溪邊的草生地，常跟斑文鳥一起活動，生性活潑好動，以穀物、種子為主食。黑頭文鳥原本為稀有的留鳥，但近年來因飼養、放生或外來種引入的因素，族群已擴散，因此目前在野外所見的黑頭文鳥並無法確認是否為台灣原生種。



▲ 黑頭文鳥大多出現在草叢中，常與斑文鳥一起活動 竹間小六 攝

● 辨識特徵：

- 1、嘴短、粗厚，鉛灰色。
- 2、頭部至上胸黑褐色，其餘大致為栗褐色。



黃民雄 攝



扇尾鶯科

- 小型鳥類，與鶯科鳥類相似，主要棲息於草叢或灌木，為草地型鳥類。
- 一般為單獨活動，活潑好動，善鳴唱，以昆蟲為主食。



褐頭鷦鶯

學名：*Prinia inornata*

英名：Plain Prinia

15cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

褐頭鷦鶯多單獨或小群出現在平地至中海拔的農耕地、開闊草原地帶，特別喜愛在芒草、蘆葦叢中活動，是活潑好動的鳥類。叫聲為「滴哩哩-滴哩哩」，以昆蟲為主食。每年3-8月為繁殖季節，會用芒草纖維等細草莖在芒草叢或灌叢中編織形狀如布袋的巢，因此又俗稱「布袋鳥」。

雀形目

扇尾鶯科



▲ 褐頭鷦鶯有著長長的尾羽

唐清良 攝

● 辨識特徵：

- 1、頭至背面大致為褐色，腹面淡黃褐色。
- 2、尾羽甚長，有不明顯的橫斑，喜歡上下大幅擺動。

▶ 褐頭鷦鶯親鳥與幼鳥



謝宗欣 攝

灰頭鷓鴣

學名：*Prinia flaviventris*

英名：Yellow-bellied Prinia

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

14cm

灰頭鷓鴣多出現在平地至中海拔農耕地、開闊草原、灌叢中穿梭活動，以昆蟲、草籽為主食，鳴聲悅耳，常會發出類似「啁--」、「咩--」或一連串由高而低五、六聲的鳴叫聲。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

扇尾鶯科



▲ 灰頭鷓鴣頭部鼠灰色略帶藍色

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、頭上暗灰色，身體背面大致為橄欖褐色，喉至上胸乳白色，下胸至腹部淡黃褐色。
- 2、有著幾乎和身體一樣長的尾羽，黃褐色，喜歡上下大幅擺動。

灰頭鷓鴣喜歡站在枝頭上發出一連串由高而
低婉轉的鳴聲



唐清良 攝

棕扇尾鶯

學名：*Cisticola juncidis*

英名：Zitting Cisticola

11cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

棕扇尾鶯又稱「錦鵲」，多出現在平地的草原、灌叢、河床、農田、山坡開墾地，常穿梭於草叢間捕食昆蟲，喜歡站立在植物、灌叢的上層或草莖的末端，張開雙腳抓住草莖。飛行時呈波浪狀，且會邊飛邊發出「梯擦、梯擦」的聲音。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

扇尾鶯科



▲ 棕扇尾鶯體型嬌小，常穿梭在草叢間覓食

竹間小六 攝


● 辨識特徵：

- 1、頭部黃褐色，有淡色過眼線；背面大致為暗褐色，羽緣黃褐色；腹部白色，兩側黃褐色；尾羽褐色，末端黑褐色。
- 2、飛行尾羽展開時會呈扇形，因而得名。



鶯科

- 嘴細尖略下彎，羽色較為單調，通常呈現褐色或橄欖綠色，但叫聲婉轉美妙具特色。
- 喜歡在濃密的草叢、灌木叢及樹林間跳動，以昆蟲為主食，為小型陸棲性鳥類。



極北柳鶯

學名：*Phylloscopus borealis*

英名：Arctic Warbler

12cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

極北柳鶯多出現在平地的防風林、樹林至低海拔的闊葉林的中上層，生性機警且活潑好動，常常只能看到牠穿梭在樹叢中捕捉昆蟲的身影，並不容易仔細觀察。叫聲為短促、輕細的「滋-滋-」。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

鶯科



▲ 極北柳鶯大多在樹層間活動，不易觀察

文武 攝

● 辨識特徵：

- 1、背部以橄欖綠色為主，腹面黃白色，翼帶黃白色。
- 2、有顯眼的黃白色長眉斑。



喜鵲/黃民雄 攝

鴉 科

- 中大型陸棲性鳥類，喜歡群聚棲息。
- 嘴大粗厚有力，鼻孔上有粗硬的剛毛覆蓋。
- 雜食性，智商高，警覺力強，叫聲粗啞，喜歡築巢於高枝上。



喜鵲

學名：*Pica pica*

英名：Black-billed Magpie

45cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

喜鵲又稱「客鳥」，相傳為清康熙年間引進。常成對活動，活動範圍從沿海至平地的樹林、農耕地；雜食性，以昆蟲、爬蟲類、雛鳥、腐肉、植物果實、種子等為食。叫聲聒噪，為粗啞單調的「夾卡、夾卡、夾卡」聲；多棲息於台灣西部之平原、山丘、鄉鎮、濱海地區附近有高大樹木的地方，築巢於木麻黃、尤加利等大型樹上，巢形為球形，體積相當龐大，直徑可達60~100cm。

	沼澤、湖泊、水塘
	河口、潮間帶、沙洲
	魚塭
	海岸、漁港
	河川、溪流
	草原、曠野
	草叢、灌叢
	農耕地
	防風林、樹林
	住家、都市附近

雀形目

鴉科



▲ 喜鵲常在田野地面上跳躍前進覓食

黃民雄 攝

● 辨識特徵：

- 1、全身以黑色為主，翼和尾羽為有藍色光澤的黑色，肩羽及腹部為白色。
- 2、尾甚長，飛行時翅膀及背上的白斑相當顯著。



▲ 喜鵲全身羽色以黑白兩色構成

黃民雄 攝



▲ 喜鵲的巢體積龐大

謝宗欣 攝



灰頭黑臉鵪/謝宗欣 攝

鵪 科

- 鵪科鳥類多出現在草叢、草原、闊葉林地帶。
- 嘴粗短，圓錐形，以植物的種子為主食。

黑臉鵪

學名：*Emberiza spodocephala*

英名：Black-faced Bunting

15cm

普遍 不普 局普 稀有 留鳥 冬候 夏候 過境 歸化

沼澤、湖泊、水塘
河口、潮間帶、沙洲
魚塭
海岸、漁港
河川、溪流
草原、曠野
草叢、灌叢
農耕地
防風林、樹林
住家、都市附近

黑臉鵪外型與麻雀有幾分類似，常在芒草、灌叢間、防風林旁活動，以植物種子及昆蟲為主食。每年九月左右來台度冬，分布範圍廣泛，為台灣鵪科鳥類中較為普遍易見的。灰頭黑臉鵪為其中一個亞種。



▲ 灰頭黑臉鵪雄鳥

謝宗欣 攝

● 辨識特徵：

- 1、灰頭黑臉鵪嘴呈粗短的圓錐型，背部羽毛以茶褐色為主，有黑色縱斑，腹面黃白色，雄鳥頭部及胸部灰黑色，眼先深黑色。
- 2、雌鳥大致似雄鳥，但羽色較淡，頭至後頸褐色有紋，有不明顯的白色眉斑，頰線白色，眼先不黑。

二劃

八哥 /192

三劃

大白鷺/21

大卷尾/189

小水鴨/47

小白鷺/25

小雨燕/152

小青足鷓/114

小雲雀/161

小燕鷗/131

小環頸鴿/87

小鸞鷲/12

四劃

中白鷺/23

中杓鷓/126

反嘴鴿/81

五劃

田鷓/122

白尾八哥/195

白冠雞/67

白眉鴨/52

白琵鷺/42

白面白鵪鶉/176

白腰文鳥/215

白腹秧雞/68

白翅黑燕鷗/135

白頭翁/181

六劃

尖尾鴨/45

尖尾濱鷓/106

灰頭鷓鶯/219

灰鵪鶉/178

灰斑鴿/92

七劃

赤足鷓/117

赤腰燕/168

赤頸鴨/53

赤腹鷓/198

八劃

夜鷺/30

東方環頸鴿/89

金斑鴿/93

長趾濱鷓/101

青足鷓/109

九劃

洋燕/164

紅尾伯勞/185

紅冠水雞/65

紅隼/56

紅胸濱鷓/104

紅鳩/145

紅領瓣足鷓/129

紅嘴鷓/142

十劃

家八哥/193

家燕/166

栗小鷺/36

高蹺鴿/77

埃及聖鸚/43

十一劃

彩鷓/73

野鴿/202

魚鷹/59

麻雀/211

十二劃

喜鵲/225

斑文鳥/213

斑頸鳩/146

棕三趾鷓/62

棕沙燕/170

棕背伯勞/186

棕扇尾鷓/221

琵嘴鷓/50

番鷓/149

黃小鷺/33

黃尾鷓/204

黃足鷓/116

黃頭鷺/27

黃鵪鶉/172

黑尾鷓/127

黑面琵鷺/39

黑腹燕鷓/133

黑腹濱鷓/100

黑頭文鳥/216

黑臉鷓/228

十三劃

極北柳鷓/223

裏海燕鷓/138

十四劃

綠頭鴨/48

綠繡眼/207

翠鳥/154

鳳頭燕鷓/140

緋秧雞/70

褐頭鷓鶯/218

蒙古鴿/96

十五劃

寬嘴鷓/107

十六劃

蒼鷺/19

燕鴿/84

十七劃

磯鷓/98

鴿子/147

十八劃

翻石鷓/128

十九劃

藍磯鷓/200

鐵嘴鴿/95

二十一劃

鶴鷓/119

二十二劃

彎嘴濱鷓/102

二十四劃

鷹斑鷓/124

二十七劃

鷓鷺/17




觀察筆記





國立臺南大學七股校區鳥類圖鑑



發行人/黃秀霜

策 劃/謝宗欣

編 著/吳虹毅

攝 影/黃民雄、唐清良、劉嘉斌(文武)、洪董、簡廷謀(竹間小
六)、謝宗欣、黃嘉隆(各攝影者均保留其著作權)

審 定/許皓捷

美 編/吳虹毅

出版者/國立臺南大學

地 址/臺南市樹林街二段33號

電 話/06-2133111

印 刷/秋雨印刷股份有限公司 06-2613121

初 版/中華民國98年9月

本圖鑑之印刷經費由教育部補助印行，謹此致謝