


声明：词条人人可编辑，创建、修改和认证均免费 [详情](#)

秒懂百科



椿象

63.6万 1'2"

桂名

百度百科

本词条由“[科普中国](#)”科学百科词条编写与应用工作项目审核

贡献者 刘柱东

[详情](#)

椿象，是六足亚门，[昆虫纲](#)，有翅亚纲，半翅目，蝽科[动物](#)，乃半翅目中种类最多的一群，全世界单椿象科种类约有5000种。椿象体长1.7~2.5公分。

体色黑褐色；头部背侧后方具一对微小的橙黄色，或橙褐色纵斑，触角最末一节末端2/3部分为橙黄色或橙褐色，部分，个体在第二、三节尚有一段橙黄或橙褐色斑。前胸背板外缘有一枚尖锐的突刺，中央有一条横向的弧形橙黄色或橙褐色细斑。

[目录](#)

中文学名 椿象

拉丁学名 *Pentatomidae*

别称 臭虫、屎屁虫、臭大姐

界 动物界

门 节肢动物门

热点关注

解读 人见人厌的臭虫却被当成了美味的食材，一盘要卖几百块钱

重口味的“臭大姐”的应该出现在不少人儿时的记忆里，但是这个人见人厌的家伙，居然能够登上餐桌成为美食。...

2018-01-12

形态特征

上翅膜质部分深褐色。腹部局部露出在上翅外侧，各节具橙色系小斑点。后脚特别发达，尤其胫节基半段呈扁平的叶片状，这是本种最主要的辨识特征。身体腹面有许多黄色斑点；最大的特征是后脚胫节呈现叶片状。

上翅前半部呈革质，膜质部分在腹背交叠出三圆锥形。具有一个很发达的刺吸式口器。卵呈圆筒状，上方有一盖状物，常排列整齐的产在叶子上。陆生椿象发达短鞭状触角；水生椿象多半具镰刀式前脚；两栖椿象的中、后脚特别细长，乍看外形近似蜘蛛。



椿象

常见的有捕食小虫、有益于农业的食虫椿象，供中药用的[九香虫](#)，供食用的[桂花蝉](#)，还有为害农业的[军配虫](#)，专门捕食幼鱼为害养殖业的[田鳖](#)和松藻等，椿象科属半翅目。

生活史及历期

1.年生活史：经周年观察，在冀中南地区茶翅椿每年发生1、2代，凡是出蛰早的成虫，在6月中旬以前产的卵，经孵化，若虫可羽化为第一代成虫，并可产卵，经若虫再羽化为越冬代(第二代)成虫。而在6月中旬以后产的卵，只能发生一代，即羽化的成虫为越冬代。黄斑椿一年发生一代。两者均以成虫在室内越冬。

椿象

(1)成虫期：通过田间和室内系统观察，茶翅椿越冬代成虫出蛰后最短生活28天，最长52天，平均38.85天。第一代成虫寿命平均为31.65天，最短16天，最长50天。越冬代成虫越冬前平均生活37.38天，最长72天，最短7天。黄斑椿一年发生一代，成虫寿命比茶翅椿长，越冬代成虫自出蛰后一直生活到7月下旬，和第一代(即越冬代)成虫重叠发生，第一代成虫一直生活到越冬，寿命长者达一年有余。

(2)卵期：不同时期所产卵的卵期不等，温度低时卵期长，温度高时卵期短，如茶翅椿5月下旬~6月上旬产的卵，卵期为6、8天，8月上、中旬产的卵卵期为3、5天。黄斑椿的卵期亦有1同样趋势，平均卵期茶翅椿为4.76±2.51天，黄斑椿为6.65±2.21天。

(3)若虫期及各龄龄期：田间个体饲养观察结果，黄斑椿若虫分5龄，1龄龄期最短(5.72±1.186天)，5龄龄期最长(18.5±1.8招天)，若虫期平均55.37±3.79天。茶翅椿亦是1龄最短，5龄最长。

分类学

扁椿象总科 *Aradoidea*

缘椿象总科 *Coreoidea*

长椿象总科 *Lygaeoidea*

红椿象总科 *Pyrrhocoroidea*

在此之中，椿象总科似乎在大致上和传统上所理解的一般是个单系群，但其他三个总科则会形成个相互混杂的类群，且因此极需要重新地予以定界。例如，拟长椿象科有时会被归类于长椿象总科之中，有时则会个别归在拟长椿象总科此一单系群中。

皮椿象科通常归在长椿象总科中，但在更仔细的研究之前，最好先设为“地位未定”，因为这一科最古老的一些成员和一些史前时期的拟长椿象总科动物极度地相似；在其之间的关系搞清楚之前，承认另一个单系

在此之中，椿象总科似乎在大致上和传统上所理解的一般是个单系群，但其他三个总科则会形成个相互混杂的类群，且因此极需要重新地予以定界。例如，拟长椿象科有时会被归类于长椿象总科之中，有时则会个别归在拟长椿象总科此一单系群中。

皮椿象科通常归在长椿象总科中，但在更仔细的研究之前，最好先设为“地位未定”，因为这一科最古老的一些成员和一些史前时期的拟长椿象总科动物极度地相似；在其之间的关系搞清楚之前，承认另一个单系

在此之中，椿象总科似乎在大致上和传统上所理解的一般是个单系群，但其他三个总科则会形成个相互混杂的类群，且因此极需要重新地予以定界。例如，拟长椿象科有时会被归类于长椿象总科之中，有时则会个别归在拟长椿象总科此一单系群中。

在此之中